




MINISTERUL MEDIULUI



**Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara**

Nr. 2816 / 30.03.2018

Aprobat,  
Director Executiv  
Viorica Georgeta BARABĂS



**RAPORT  
PRIVIND CALITATEA AERULUI  
ÎNCONJURĂTOR PENTRU  
ANUL 2017 ÎN JUDEȚUL  
HUNEDOARA**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

Str. Aurel Vlaicu nr.25, Deva, Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel/Fax. 0254.215.445, 0254.215.446 / 0254.212.252

## 1. INTRODUCERE

Aerul atmosferic natural, nepoluat, are o compoziție diferită de cel pe care îl inspirăm noi astăzi, mai ales cei care locuim în orașe dotate cu diverse întreprinderi de produs fum, praf și alte gaze nocive. Compoziția chimică a aerului natural este următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 20,946%, argon – 0,934%, binoxid de carbon – 0,0331%. Au mai fost detectate și următoarele elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, ozon, xenon, precum și metan, oxid de azot și vaporii de apă. Agentii poluanți evacuați în atmosferă pot fi transportați pe zone mai mari datorită acțiunii factorilor meteorologici. Principalii factori meteorologici care intervin în modificarea gradului de poluare sunt viteza vântului și stabilitatea aerului. Datorită curenților de aer, poluanții sunt răspândiți pe o suprafață mare în zonele învecinate activității poluatoare.

Surse naturale de poluare: eroziunea eoliană, incendiile, reziduurile de natură vegetală și animală și/sau fenomenele vulcanice.

Surse artificiale de poluare: centrale termoelectrice, industria siderurgică, industria metalurgică, industria chimică, întreprinderile de materiale de construcții și transporturile.

Consecințele aerului poluat asupra sănătății oamenilor:

- efecte acute (immediate);
- efecte cronice produse de concentrații mai reduse de poluanți atmosferici dar care în timp pot conduce la modificări patologice (ex. bronhopneumonii cronice, emfizem pulmonar, astm bronsic, pneumonie, bronșită cronică, conjunctivite, răhitism, îmbolnăviri ale aparatului nervos central, cancer pulmonar etc.);

Consecințele aerului poluat asupra construcțiilor: eroziune de degradare, eroziune de corodare, schimbarea culorii.

Consecințele aerului poluat asupra plantelor și animalelor:

- lezarea plantelor ducând până la dispariție în unele cazuri;
- îmbolnăvirea animalelor;

Potențialele surse de poluare ale aerului din județul Hunedoara sunt: unitățile de producere a energiei electrice și termice, unitățile siderurgice unitățile de producere a materialelor de construcție, transporturile, etc.

## 2. CALITATEA AERULUI

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin Contractul nr. 84/11.01.2006 încheiat între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și DAMAT Italia, în asociere cu ORION SRL Italia și ORION EUROPE România, în baza acordului cadre de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, privind finanțarea „Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului”, a primit în dotare 4 stații automate de monitorizare a calității aerului repartizate astfel: 2 pe Deva, 1 Hunedoara și 1 Călan, precum și două panouri de informare a publicului: 1 panou exterior, amplasat în Deva, P-ța Victoriei și 1 panou interior la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25.

În urma completării rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, prin Contractul nr. 4361/2007, s-a primit o stație automată pentru municipiul Vulcan,

care a fost pusă în funcțiune începând cu luna martie 2010 și un panou interior de informare a publicului, amplasat în incinta Primăriei Municipiului Vulcan.

Tipul stațiilor este următorul:

- HD - 1 stație fond urban - Deva str. Carpați;
- HD - 2 stație fond industrial 1- Deva, Calea Zarandului;
- HD - 3 stație fond industrial 1- Hunedoara, str. Bicicliștilor;
- HD - 4 stație fond industrial 1- Călan, str.Furnalistului.
- HD - 5 stație fond industrial 1- Vulcan, bd. Mihai Viteazu.

Stația de fond urban monitorizează indicatorii: NO<sub>x</sub>/NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, COV, PM<sub>10</sub>, stația meteo;

Stațiile de fond industrial 1 monitorizează indicatorii: NO<sub>x</sub>/NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub>, stația meteo.

Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Hunedoara se prezintă în figura de mai jos



Figura nr. 2.1. Amplasarea stațiilor de monitorizare

Menționăm faptul că stația HD-3 din Hunedoara nu mai funcționează din anul 2010, deoarece în data de 19.06.2010 a fost inundată în urma ploilor torențiale.

Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara

Sinteza datelor provenite de la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din anul 2017 este prezentată în tabelul următor:

Stație	Poluant	Media aritmetică pe întreaga perioadă	Unitate măsură	Tip depășire	Nr. depășiri	Captura de date (%) (validate pe anul 2017)
HD – 1 Deva, fond urban	SO <sub>2</sub>	9,32	µg/mc			90,74
	NO <sub>2</sub>	25,83	µg/mc			90,21
	CO	0,26	mg/mc			98,14
	O <sub>3</sub>	39,97	µg/mc	valoare țintă	11	93,86
	Benzen	2,69	µg/mc			79,95
	PM <sub>10</sub> automat	13,44	µg/mc			88,13
	PM <sub>10</sub> gravimetric	16,38	µg/mc	limită zilnică	6	93,96
	Pb	0,014	µg/mc			78,90
	Cd	0,3265	ng/mc			70,41
	Ni	4,8713	ng/mc			70,41
HD - 2 Deva, Calea Zarandului fond industrial	SO <sub>2</sub>	10,96	µg/mc			94,05
	NO <sub>2</sub>	16,58	µg/mc			91,08
	CO	0,19	mg/mc			94,27
	O <sub>3</sub>	45,04	µg/mc	valoare țintă	19	94,78
	PM <sub>10</sub> automat	23,27	µg/mc	limită zilnică	37	91,22
	PM <sub>10</sub> gravimetric	21,46	µg/mc	limită zilnică	22	92,32
	Pb	0,016	µg/mc			76,71
	Cd	0,2548	ng/mc			69,86
	Ni	4,1442	ng/mc			69,86
HD - 4 Călan, str. Furnalistului Fond industrial	SO <sub>2</sub>	6,19	µg/mc			90,35
	NO <sub>2</sub>	10,19	µg/mc			89,22
	CO	0,24	mg/mc			86,63
	O <sub>3</sub>	33,83	µg/mc	valoare țintă	4	26,85
	PM <sub>10</sub> automat	12,53	µg/mc			34,10
	PM <sub>10</sub> gravimetric	21,07	µg/mc	limită zilnică	5	92,59
	Pb	0,017	µg/mc			77,81
	Cd	0,3035	ng/mc			69,86
	Ni	4,9181	ng/mc			69,86
HD - 5 Vulcan, str. Mihai Viteazu, fond industrial	SO <sub>2</sub>	13,98	µg/mc			2,72
	NO <sub>2</sub>		µg/mc			0
	CO	0,65	mg/mc			1,28
	PM <sub>10</sub> automat	25,94	µg/mc			64,37
	PM <sub>10</sub> gravimetric	22,66	µg/mc			63,01
	Pb	0,021	µg/mc			62,74
	Cd	0,3293	ng/mc			62,74
	Ni	5,316	ng/mc			62,74

Tabelul nr. 2.1. Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului în județul Hunedoara la nivelul anului 2017

Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara

Valorile măsurate de stațiile automate de monitorizare a calității aerului sunt comparate cu limitele pentru protecția sănătății umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Poluant	Criteriu	Perioadă de mediere	Valoare	Unitate de măsură	Numărul de depășiri anuale permis (dacă există)
Dioxid de sulf, SO <sub>2</sub>	Valoare limită	o oră	350	µg/m <sup>3</sup>	24
	Valoare limită	24h	125	µg/m <sup>3</sup>	3
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	500	µg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
Particule în suspensie, PM <sub>10</sub>	Valoare limită	o zi	50	µg/m <sup>3</sup>	35
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
Dioxid de azot, NO <sub>2</sub>	Valoare limită	o oră	200	µg/m <sup>3</sup>	18
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	400	µg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
Benzen	Valoare limită	an calendaristic	5	µg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
Monoxid de Carbon, CO	Valoare limită	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	10	mg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
Ozon, O <sub>3</sub>	Valoare țintă	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	120	µg/m <sup>3</sup>	25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani
	Pragul de informare	o oră	180	µg/m <sup>3</sup>	-
	Pragul de alertă	o oră	240	µg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
Plumb, Pb	Valoare limită	An calendaristic	0,5	µg/m <sup>3</sup>	Nu e cazul
Arsen, As	Valoare țintă	An calendaristic	6	ng/mc	Nu e cazul
Cadmiu, Cd	Valoare țintă	An calendaristic	5	ng/mc	Nu e cazul
Nichel, Ni	Valoare țintă	An calendaristic	20	ng/mc	Nu e cazul

Tabelul nr. 2.2. Valorile limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

## 2.1. Dioxidul de azot

Dioxidul de azot este un gaz de culoare brună, rezultat din oxidarea monoxidului de azot cu aerul. În atmosferă, în reacție cu vaporii de apă se formează acid azotic sau azotos, care conferă ploilor caracterul acid.

Dioxidul de azot este un gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator și diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO<sub>2</sub> este de 4 ori mai mare decât cel al NO), este produs din surse naturale, ca urmare a acțiunii bacteriilor la nivelul solului, iar din surse antropice prin încălzirea rezidențială și trafic rutier.

Valorile medii orare obținute la indicatorul dioxid de azot, în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare nu arată depășiri ale valorii limită orare prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, respectiv de 200 µg/mc (a nu se depăși mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) și nici depășirea pragului de alertă de 400 µg/mc, înregistrat timp de 3 ore consecutiv.

Valoarea limită anuală prevăzută în Legea nr. 104/2011 de 40 µg/mc/an nu a fost depășită la nici una dintre stațiile din județ.

În tabelul următor prezentăm evoluția valorilor orare obținute la indicatorul NO<sub>2</sub>, pe parcursul anului 2017 la stațiile automate de monitorizare a calității aerului.




Figura nr. 2 1.1. Evoluția valorilor orare de NO<sub>2</sub> (µg/mc), în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare

## 2.2. Dioxidul de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înăbușitor și pătrunzător. Acesta este transportat la distanțe mari datorită faptului că se fixează ușor pe particulele de praf. În atmosferă, în reacție cu vaporii de apă formează acid sulfuric sau sulfuros, care conferă caracterul acid al ploilor. Oxizii de sulf (dioxidul și trioxidul de sulf) rezultă în principal din surse staționare și mobile, prin arderea combustibililor fosili.

Prezența dioxidului de sulf în atmosferă peste anumite limite are efecte negative asupra plantelor, animalelor și omului. La plante, dioxidul de sulf induce în sistemul foliar, leziuni locale, care reduc fotosinteză. La om și animale, în concentrații reduse produce iritarea aparatului respirator, iar în concentrații mai mari provoacă spasm bronșic. De asemenea, dioxidul de sulf produce tulburări ale metabolismului glucidelor și a proceselor enzimatiche. Efectul toxic al dioxidului de sulf este accentuat de prezenta pulberilor.

Valorile medii orare obținute la indicatorul dioxid de sulf, în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare nu arată depășiri ale valorii limită orare prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, respectiv de 350 µg/mc (a nu se depăși mai mult de 24 ori într-un an calendaristic) și nici a valorile medii zilnice de 125 µg/mc și nici depășirea pragului de alertă de 500 µg/mc, înregistrat timp de 3 ore consecutiv.

În figurile următoare prezentăm evoluția valorilor orare și zilnice de SO<sub>2</sub> pe parcursul anului 2017, la stațiile automate de monitorizare a calității aerului:




Figura nr. 2.2. 1. Evoluția valorilor orare de SO<sub>2</sub> (µg/mc)  
în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare

## Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara




Figura nr. 2.2.2. Evoluția valorilor zilnice de SO<sub>2</sub> (µg/mc) în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare

### 2.3. PM<sub>10</sub>

PM<sub>10</sub> sunt definite, conform Legii 104/2011 drept particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea PM<sub>10</sub>, SR EN 12341, cu un randament de separare de 50 % pentru un diametru aerodinamic de 10 µm.

Poluarea atmosferei cu particule în suspensie are multe surse: în primul rând procesele industriale, cantitatea cea mai importantă provenind din metalurgie și siderurgie, urmate de centralele termice pe combustibili solizi, fabricile de ciment, transporturile rutiere, haldele și depozitele de steril. Amintim în principal haldele de steril și iazurile de decantare ca o caracteristică a județului Hunedoara, a căror particule sunt antrenate de vânt pe distante de zeci de kilometri. Particulele minerale conținute în gazele de ardere evacuate în atmosferă, mai ales când instalațiile de epurare a gazelor funcționează defectuos sau nu funcționează deloc, reprezintă un pericol grav pentru plante, sol și aer. Prin depunerea acestora pe sol și plante, datorită sedimentării proprii sau acțiunii precipitațiilor, se constată o creștere a concentrației de metale grele.

Prezența particulelor solide în atmosferă influențează negativ transparența aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei părți din căldura solară și modifică regimul precipitațiilor.

În general particulele au o acțiune iritantă asupra ochilor, sistemului respirator și de scădere a organismului la infecții. Toxicitatea particulelor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar și dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul <10 microni (PM<sub>10</sub>) și cele cu diametrul <2,5 microni (PM<sub>2,5</sub>) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații.

*Valori ale PM<sub>10</sub> obținute prin determinări semiautomate*

*Particule în suspensie sub 10 microni (PM<sub>10</sub>) : valoare limită zilnică = 50 µg/mc (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic); Valoare limită anuală = 40 µg/mc, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Acest indicator s-a determinat în municipiul Deva, începând cu luna martie 2007, folosindu-se un sistem de prelevare particule în suspensie LVS3 și utilizând metoda gravimetrică.*



Figura nr. 2.3.1. Sistem prelevare particule in suspensie LVS3 utilizat la determinarea PM<sub>10</sub>

Valoarea medie pe anul 2017 la indicatorul PM<sub>10</sub> a fost de 28,332 µg/mc, în creștere față de anul precedent, când s-a înregistrat o valoare medie anuală de 18,546 µg/mc, fără a depăși valoarea limită anuală de 40 µg/mc. Pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat 11 depășiri ale valorii limită zilnice de 50 µg/mc (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

*Valori ale PM<sub>10</sub> obținute la stațiile automate (determinate prin metoda gravimetrică)*

În anul 2017 valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni (PM<sub>10</sub>) în aerul înconjurător, obținute la stațiile automate (determinate prin metoda gravimetrică) nu au depășit mai mult de 35 ori valoarea limită zilnică (50 µg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011. Astfel, s-au înregistrat la indicatorul PM<sub>10</sub>:

- 6 depășiri la stația HD-1 din Deva, str. Carpați, f.n.
  - 22 depășiri la stația HD-2 din Deva, Calea Zarandului, f.n.
  - 5 depășiri la stația HD-4 din Călan, str. Furnalistului, f.n.
  - 1 depășire la stația HD-5 din Vulcan, str. Mihai Viteazu, f.n.
- după cum urmează:

Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara

nume statie	an	luna	zi din lună	valoare concentrație	contor (nr. total de depășiri pe fiecare stație de la inceputul anului)	justificare depășire
HD1-FU	2017	ianuarie	13	54,5	1	Depășirile au fost cauzate de utilizarea la încălzirea locuințelor individuale a combustibililor solizi, precum și datorită existenței instalației mari de ardere din zonă, pe fondul unor condiții meteo nefavorabile unei bune dispersii a poluanților (ceață).
HD1-FU	2017	ianuarie	22	81,76	2	
HD1-FU	2017	ianuarie	24	54,5	3	
HD1-FU	2017	ianuarie	29	70,86	4	
HD1-FU	2017	februarie	2	72,67	5	
HD1-FU	2017	februarie	3	70,85	6	
HD2-FI	2017	ianuarie	1	61,18	1	
HD2-FI	2017	ianuarie	2	76,51	2	
HD2-FI	2017	ianuarie	11	54,5	3	
HD2-FI	2017	ianuarie	12	74,49	4	
HD2-FI	2017	ianuarie	13	92,65	5	
HD2-FI	2017	ianuarie	20	89,02	6	
HD2-FI	2017	ianuarie	21	94,47	7	
HD2-FI	2017	ianuarie	22	96,29	8	
HD2-FI	2017	ianuarie	23	72,67	9	
HD2-FI	2017	ianuarie	24	70,85	10	
HD2-FI	2017	ianuarie	25	69,04	11	
HD2-FI	2017	ianuarie	27	65,4	12	
HD2-FI	2017	ianuarie	29	92,65	13	
HD2-FI	2017	ianuarie	30	103,5	14	
HD2-FI	2017	februarie	2	89,02	15	
HD2-FI	2017	februarie	3	98,1	16	
HD2-FI	2017	februarie	16	90,84	17	
HD2-FI	2017	februarie	17	110,82	18	
HD2-FI	2017	octombrie	27	56,32	19	
HD2-FI	2017	octombrie	28	63,6	20	
HD2-FI	2017	octombrie	29	52,69	21	
HD2-FI	2017	decembrie	12	78,12	22	
HD4-FI	2017	ianuarie	23	59,96	1	Valoarea limită anuală (40 µg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011 nu a fost depășită la nici una dintre stațiile automate de monitorizare.
HD4-FI	2017	ianuarie	28	70,85	2	
HD4-FI	2017	ianuarie	29	54,5	3	
HD4-FI	2017	februarie	2	96,29	4	
HD4-FI	2017	februarie	3	76,31	5	
HD5-FI	2017	noviembrie	12	67,27	1	

Notă: FU – fond urban; FI – fond industrial

Tabelul nr. 2.3.1. PM<sub>10</sub> gravimetric la stațiile automate de monitorizare a calității aerului - depășirile valorii limită zilnice (50 µg/mc, a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic)

Valoarea limită anuală (40 µg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011 nu a fost depășită la nici una dintre stațiile automate de monitorizare.

## Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara

În figura următoare prezentăm evoluția valorilor zilnice obținute la indicatorul PM<sub>10</sub> (determinat prin metoda gravimetrică), pe parcursul anului 2017, la stațiile automate de monitorizare a calității aerului:




Figura nr. 2.3.2. Evoluția zilnică a valorilor de PM<sub>10</sub> (µg/mc) determinat gravimetric în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare

## 2.4. Metale grele


Metalele grele (mercur, plumb, cadmiu, etc.) sunt compuși care nu pot fi degradăți pe cale naturală, având un timp îndelungat de remanență în mediu, iar pe termen lung sunt periculoși deoarece se pot acumula în lanțul trofic.

Metalele grele pot provoca afecțiuni musculare, nervoase, digestive, stări generale de apatie; pot afecta procesul de dezvoltare a plantelor, împiedicând desfășurarea normală a fotosintezei, respirației sau transpirației.


În anul 2017 s-au efectuat, în urma analizei gravimetrice a filtrelor prelevate de la stațiile automate de monitorizare a calității aerului: HD-1 și HD-2 din Deva, HD-4 din Călan și HD-5 din Vulcan, determinări de plumb, cadmiu și nichel din particulele în suspensie (PM<sub>10</sub>).

Valoarea limită anuală pentru plumb și valoarea țintă pentru cadmiu și nichel prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu au fost depășite la nici una dintre stațiile automate.


## Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara



**Figura nr. 2.4.1. Evoluția valorilor zilnice de Pb ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ ) din  $\text{PM}_{10}$  gravimetric în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare**



**Figura nr. 2.4.2. Evoluția valorilor zilnice de Cd ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ ) din  $\text{PM}_{10}$  gravimetric în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare**



**Figura nr. 2.4.3. Evoluția valorilor zilnice de Ni ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ ) din  $\text{PM}_{10}$  gravimetric în anul 2017, la stațiile automate de monitorizare**

## 2.5. Monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, care se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili.

Surse naturale: incendierea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice.

Surse antropice: se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili.

Alte surse antropice: producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar.

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.

În județul Hunedoara monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la stațiile de monitorizare a calității aerului.

La stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Hunedoara nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită 10  $\text{mg}/\text{mc}$  (calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore) conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara




Figura nr. 2.5.1. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8h de CO (mg/mc) în anul 2017 la stațiile automate de monitorizare

## 2.6. Benzenul

Benzenul este un compus aromatic cancerigen, puternic volatil și solubil în apă.

Acest indicator a fost monitorizat doar la stația de fond urban din municipiul Deva, str. Carpați, iar valoarea medie anuală înregistrată în anul 2017 a fost de 2,69 µg/mc/an și nu a depășit valoarea limită anuală de 5 µg/mc prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.




Figura nr. 2.6.1. Evoluția zilnică a valorilor de benzen ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ ) în anul 2017 la stația automată de monitorizare HD-1

## 2.7. Ozonul

Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecule formată din trei atomi. Acesta este un puternic oxidant cu miros caracteristic, de culoare albăstruie și foarte toxic. În atmosferă, se poate forma pe cale naturală în urma descărările electrice și sub acțiunea razelor solare, iar artificial ca urmare a reacțiilor unor substanțe nocive, provenite din sursele de poluare terestră. Ozonul format în partea inferioară a troposferei este principalul poluant în orașele industrializate. Ozonul troposferic se formează din oxizii de azot (în special dioxidul de azot), compușii organici volatili – COV, monoxidul de carbon în prezența razelor solare, ca sursă de energie a reacțiilor chimice.

Smogul fotochimic este o ceată toxică produsă prin interacția chimică între emisiile poluante și radiațiile solare. Cel mai întâlnit produs al acestei reacții este ozonul. În timpul orelor de vârf, în zonele urbane, concentrația atmosferică a oxizilor de azot și de hidrocarburi crește rapid, datorită traficului intens. În același timp, cantitatea de dioxid de azot din atmosferă scade datorită faptului că lumina solară duce la descompunerea acestuia în oxid de azot și atomi de oxigen. Atomii de oxigen combinați cu oxigenul molecular formează ozonul. Hidrocarburile se oxidează și reacționează cu oxidul de azot pentru a produce dioxidul de azot. Pe măsură ce se apropie mijlocul zilei, concentrația de ozon devine maximă, cuplat cu un minimum de oxid de azot. Această combinație produce un nor toxic de culoare galbenie cunoscut drept smog fotochimic.

Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara

Acest indicator a fost monitorizat la următoarele stații automate de monitorizare a calității aerului: HD-1 (Deva, str. Carpați), HD-2 (Deva, str.Calea Zarandului) și HD-4 (Călan, str. Furnalistului).

În anul 2017 au fost înregistrate depășiri ale valorii țintă pentru sănătatea umană (120 microg/m<sup>3</sup>, maxima zilnică a mediilor pe 8 ore), după cum urmează:

- 11 depășiri la stația HD-1 din Deva, str. Carpați, f.n.
- 19 depășiri la stația HD-2 din Deva, Calea Zarandului, f.n.
- 4 depășiri la stația HD-4 din Călan, str. Furnalistului, f.n.

nume stație	an	luna	zi din lună	valoare concentrație	contor (nr total de depășiri pe fiecare stație de la începutul anului)	justificare depășire
HD1-FU	2017	iunie	3	125,05	1	Depășirile la ozon au fost cauzate de creșterea temperaturilor și a duratei de iluminare diurnă, factori care favorizează reacțiile fotochimice de formare a ozonului, precum și de radiația ultravioletă intensă, aceasta având un rol determinant în formarea acestui compus chimic.
HD1-FU	2017	iunie	23	134,57	2	
HD1-FU	2017	iunie	24	130,05	3	
HD1-FU	2017	iunie	25	144,36	4	
HD1-FU	2017	iulie	19	137,04	5	
HD1-FU	2017	iulie	20	148,09	6	
HD1-FU	2017	iulie	21	128,94	7	
HD1-FU	2017	iulie	22	131,28	8	
HD1-FU	2017	iulie	23	124,48	9	
HD1-FU	2017	iulie	24	125,07	10	
HD1-FU	2017	august	4	123,77	11	
HD2-FI	2017	aprilie	1	122,41	1	
HD2-FI	2017	aprilie	2	136,42	2	
HD2-FI	2017	aprilie	3	124,56	3	
HD2-FI	2017	aprilie	26	123,52	4	
HD2-FI	2017	aprilie	27	121,6	5	
HD2-FI	2017	mai	19	128,15	6	
HD2-FI	2017	iunie	3	127,61	7	
HD2-FI	2017	iunie	23	135,23	8	
HD2-FI	2017	iunie	24	131,46	9	
HD2-FI	2017	iunie	25	152,11	10	
HD2-FI	2017	iunie	28	121,38	11	
HD2-FI	2017	iulie	8	120,85	12	
HD2-FI	2017	iulie	19	129,95	13	
HD2-FI	2017	iulie	20	135,47	14	
HD2-FI	2017	iulie	21	126,07	15	
HD2-FI	2017	iulie	22	122,8	16	
HD2-FI	2017	iulie	23	122,73	17	
HD2-FI	2017	iulie	31	132,86	18	
HD2-FI	2017	august	4	125,66	19	
HD4-FI	2017	septembrie	10	123,79	1	
HD4-FI	2017	septembrie	11	141,45	2	
HD4-FI	2017	septembrie	12	141,03	3	
HD4-FI	2017	septembrie	16	128,72	4	

Tabelul nr. 2.7.1. Ozon: Depășirile valorii țintă pentru sănătatea umană (120 µg/mc, maxima zilnică a mediilor pe 8 ore)

## Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara




Figura nr. 2.7.1. Evoluția valorilor zilnice la ozon ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ ) în anul 2017 la stațiile automate de monitorizare




Figura nr. 2.7.2. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 h la ozon ( $\mu\text{g}/\text{mc}$ ) în anul 2017 la stațiile automate de monitorizare02

## 2.8.Tendințe

Calitatea aerului în județul Hunedoara continuă tendința generală de îmbunătățire din ultimii ani. În urma prelucrării datelor din rețeaua automată de monitorizare a calității aerului (pusă în funcțiune începând cu anul 2008) nu se observă creșteri semnificative față de anii precedenți a valorilor medii anuale la majoritatea poluanților monitorizați.

Evoluția calității aerului, în perioada 2008 – 2017, în județul Hunedoara este prezentată grafic pe indicatorii de calitate monitorizați, după cum urmează:




Figura nr. 2.8.1. Evoluția valorilor medii anuale de dioxid de azot obținute prin rețeaua automată de monitorizare a calității aerului, în perioada 2008 – 2017

Raport privind calitatea aerului pentru anul 2017 în județul Hunedoara




Figura nr. 2.8.2. Evoluția valorilor medii anuale de dioxid de sulf obținute prin rețeaua automată de monitorizare a calității aerului, în perioada 2008 – 2017




Fig. 2.8.3 Evoluția particulelor în suspensie (PM<sub>10</sub>), în perioada 2007 – 2017, obținute prin determinări semiautomate la punctul situat în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25




Figura nr. 2.8.4. Evoluția valorilor medii anuale ale PM<sub>10</sub> determinate gravimetric, obținute prin rețeaua automată de monitorizare a calității aerului, în perioada 2009 – 2017




Figura nr. 2.8.5. Evoluția valorilor medii anuale de monoxid de carbon obținute prin rețeaua automată de monitorizare a calității aerului, în perioada 2008 – 2017




Figura nr. 2.8.6. Evoluția concentrațiilor medii anuale a benzenului, obținută prin rețeaua automată de monitorizare a calității aerului în perioada 2008 – 2017




Figura nr. 2.8.7. Evoluția valorilor medii anuale ale ozonului, obținute prin rețeaua automată de monitorizare a calității aerului în perioada 2008-2017

Notă: VL = valoare limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Avizat: Șef Serviciu Emilia BĂLUŞ

Redactat: Anda FRENTONI