



Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

Nr.: 2609 /ML/ 29.03.2017

RAPORT PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN LUNA FEBRUARIE 2017 ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

CAPITOLUL 1 - STAREA DE CALITATE A ATMOSFEREI ȘI A PRECIPITAȚIILOR

1.1. Poluarea de impact

Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente și mai importante implicații asupra sănătății omului.

Aerul atmosferic natural, nepoluat, are o compoziție diferită de cel pe care îl inspirăm noi astăzi, mai ales cei care locuim în orașe dotate cu diverse întreprinderi de produs fum, praf și alte gaze nocive. Compoziția chimică a aerului natural este următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 20,946%, argon – 0,934%, bioxid de carbon – 0,0331%. Au mai fost detectate și următoarele elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, ozon, xenon, precum și metan, oxid de azot și vaporii de apă. Agenții poluanți evacuați în atmosferă pot fi transportați pe zone mai mari datorită acțiunii factorilor meteorologici. Principalii factori meteorologici care intervin în modificarea gradului de poluare sunt viteza vântului și stabilitatea aerului. Datorită curenților de aer, poluanții sunt răspândiți pe o suprafață mare în zonele învecinate activității poluatoare.

Surse naturale de poluare: eroziunea coliană, incendiile, reziduurile de natură vegetală și animală și/sau fenomenele vulcanice.

Surse artificiale de poluare: centrale termoelectrice, industria siderurgică, industria metalurgică, industria chimică, întreprinderile de materiale de construcții și transporturile.

Consecințele aerului poluat asupra sănătății oamenilor:

- Efecte acute (imediate);

- Efecte cronice produse de concentrații mai reduse de poluanți atmosferici dar care în timp pot conduce la modificări patologice (ex. bronhopneumonii cronice, emfizem pulmonar, astm bronsic, pneumonie, bronșită cronică, conjunctivite, răhitism, îmbolnăviri ale aparatului nervos central, cancer pulmonar etc.);

Consecințele aerului poluat asupra construcțiilor: eroziune de degradare, eroziune de corodare, schimbarea culorii.

Consecințele aerului poluat asupra plantelor și animalelor:

- Lezarea plantelor ducând până la dispariție în unele cazuri;

- Îmbolnăvirea animalelor;

Consecințele aerului poluat asupra condițiilor de viață: atmosfera poluată crează disconfort prin imposibilitatea deschiderii ferestrelor și aerisirii încăperilor, a uscării rufelor în curte sau balcon, servirii mesei în curte, plimbărilor în aer liber, a jocului copiilor etc.

1.2. Rețeaua manuală de monitorizare a calității aerului

În rețeaua de supraveghere a poluării de impact din județul Hunedoara au fost efectuate măsurători privind: amoniacul, pulberile în suspensie, PM₁₀ și pulberile sedimentabile.

Potențialele surse de poluare ale aerului din județul Hunedoara sunt: unitățile siderurgice, unitățile de producere a energiei electrice și termice, unitățile de producere a materialelor de construcție, etc.

Monitorizarea calității aerului a fost asigurată de 5 puncte de control dotate cu pompe de aspirație pentru aerosoli, 3 puncte pentru amoniac, 1 punct pentru PM₁₀ și 25 puncte pentru pulberile sedimentabile, cu următoarea repartizare:

Județ	Oraș	Stația	Tip stație	Poluant	Tip determinare	Obs.
Hunedoara	Deva	A.P.M. Deva	Urbană	NH3	manual	STAS 12574/87
				Pulberi sedimentabile	manual	"
				PM ₁₀	manual	Legea 104/2011
		Stația IRE	Trafic	Pulberi sedimentabile	manual	STAS 12574/87
		Deva, str. Matei Corvin	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Deva, Stația hidrometeo	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Sat. Vețel	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Hunedoara	Spital Hunedoara	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
				Pulberi sedimentabile	manual	"
				NH3	manual	"
		Stația de epurare Buituri	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Hunedoara, str. Voinii, nr.6	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Sat Zlasti, nr.2	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Simeria	Simeria - stadion	Urbană	Pulberi în suspensie	manual	"
				NH3	manual	"

Petroșani	Livezeni – Sediul Hidroconstrucția	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"		
	Paroșeni – DN66 A - Baraj	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"		
	Paroșeni – str. Minei, nr. 25	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Vulcan, str. Decebal, nr. 14	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Lupeni, str. Sohodol, nr. 7	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Petroșani – Universitate	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"		
	Petroșani, str. 22 Decembrie, nr. 4	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Livezeni, sediu Hidroconstrucția	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Iscrone – Coroești, str. Secului, nr. 10	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Brad		Tebea– post hidro	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Văta - Poliție			Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
Călan	Călan - Primărie	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
Orăștie	District Apelor Orăștie	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"		
Baru Mare	Baru Mare, nr. 303	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
Chișcădaga	Nr. 65	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Nr. 15	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Nr. 7	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Sat. Bejan, nr. 58	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		
	Șoimuș - Primărie	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"		

Tabel nr. 1.2.1. Situația punctelor de prelevare în județul Hunedoara

În tabelul următor este prezentată statistica lunară pentru indicatorii de calitate a aerului, rezultați în urma măsurătorilor manuale, și anume:

Nr crt	Indicator	UM	Act normativ/ Valoare limită	Nr. total pro- be	Nr. probe ce dep. CMA/VL/ praguri♦	Minima masura- tă (1)	Maxima masura- tă (2)	Conc. medie
1.	NH ₃	mg/mc	STAS 12574/87 0,10	52	0	0,004	0,016	0,0090
2.	Pulberi in suspensie	mg/mc	STAS 12574/87 0,15	74	0	0,022	0,106	0,0662
3.	PM10	µg/mc	Legea 104/2011 50	20	3	10,98	141,37	52,078
4.	Pulberi sedimentabile	g/mp/lună	STAS 12574/87 17,0	23	0	4,95	14,23	8,199

Tabel nr. 1.2.2. Calitatea aerului – date lunare pentru indicatorii de calitate

Prelucrările statistice ale concentrațiilor indicatorilor de calitate ai aerului în județul Hunedoara nu au pus în evidență, în general, modificări semnificative ale concentrațiilor medii lunare comparativ cu luna anterioară, la indicatorii monitorizați.

Principalele surse potențiale de poluare pentru oxizii de azot și oxizii de sulf sunt reprezentate de arderea combustibililor, procesele industriale și traficul rutier, iar pentru amoniac – epurarea apelor uzate, deșeurile menajere și activitatea spitalicească. Amintim că industria cimentului reprezintă una dintre activitățile poluatoare a atmosferei datorită concentrațiilor de praf, SO₂, NO_x, CO, pulberi metalice, hidrocarburi nearse complet.

Analizând valorile medii obținute în perioada februarie 2017, în comparație cu valorile corespunzătoare lunii anterioare, s-au constatat următoarele:

➤ Amoniac (NH₃) - CMA = 0,10 mg/mc/aer/24h. Acest indicator s-a determinat în Hunedoara, Deva și Simeria. Valorile medii înregistrate, în comparație cu luna ianuarie 2017, prezintă o ușoară creștere pe zonele Hunedoara și Simeria. Valorile medii lunare au fost cuprinse între 0,0058 mg/mc aer/24h pe zona Simeria și 0,0120 mg/mc aer/24h pe zona Hunedoara.




Fig. nr. 1.2.1. Evoluția calității amoniacului în perioada ianuarie 2017 –februarie 2017

Fixarea azotului la înălțimi mari are loc prin reacții fotochimice cu formarea de amoniac și nitrați; la înălțimi mici azotul este fixat pe cale electrochimică (sub acțiunea descăr cărilor electrice) cu formare de amoniac. Amoniacul se degajă și de la crescătoriile de animale.

1.2.1. Poluarea cu pulberi în suspensie și sedimentabile

Pulberile sedimentabile și cele în suspensie provin de la activitățile siderurgice, termocentrale, transporturi, etc. Amintim în principal haldele de steril și iazurile de decantare, ca o caracteristică a județului Hunedoara, a căror particule sunt antrenate de vânt pe distante de zeci de kilometri. Pulberile minerale conținute în gazele de ardere evacuate în atmosferă, mai ales când instalațiile de epurare a gazelor funcționează defectuos sau nu funcționează deloc, reprezintă un pericol grav pentru plante, sol și aer. Prin depunerea acestora pe sol și plante, datorită sedimentării proprii sau acțiunii precipitațiilor, se constată o creștere a concentrației de metale grele.

Prezența particulelor solide în atmosferă influențează negativ transparența aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei părți din căldura solară și modifică regimul precipitațiilor.

- Pulberi în suspensie – CMA = 0,150 mg/mc aer/24h. Valorile medii lunare, față de luna ianuarie 2017, au scăzut pe zona Valea Jiului . Valorile medii lunare au fost cuprinse între 0,0276 mg/mc aer/24h pe zona Hunedoara și 0,0896 mg/mc aer/24h pe zona Valea Jiului.




Fig. nr. 1.2.1.1. Evoluția calității pulberilor în suspensie în perioada ianuarie 2017 – februarie 2017

- PM₁₀ – Valoarea limită – VL = 50 µg/mc aer/24h, conform Legii 104/2011 (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic). Valoarea medie înregistrată la acest indicator, la punctul de monitorizare situat în curtea A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în luna februarie 2017 a fost de 52,078 µg/mc aer/24h,

minima înregistrată fiind de 10,98 $\mu\text{g}/\text{mc}$ aer/24h, iar valoarea maxima de 141,37 $\mu\text{g}/\text{mc}$ aer/24h, depășind valoarea limită zilnică prevăzută în Legea 104/2011 de trei ori în decursul lunii.

Efecte asupra sănătății:

- toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar și dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul $<10 \mu$ (PM_{10}) și cele cu diametrul $<2,5 \mu$ ($\text{PM}_{2,5}$) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații.

➤ Pulberi sedimentabile – CMA = 17 g/mp/lună, valorile medii au crescut ușor, în comparație cu luna precedentă, pe zonele: Oraștie, Brad, Baru Mare, Călan și Valea Jiului. Valorile medii lunare au fost cuprinse între 6,09g/mp/lună pe zona Deva și 11,1 g/mp/lună pe zona Valea Jiului.




Fig. nr. 1.2.1.2. Evoluția calității pulberilor sedimentabili în perioada ianuarie 2017 - februarie 2017

1.3. Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin Contractul nr. 84/11.01.2006 încheiat între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și DAMAT Italia, în asociere cu ORION SRL Italia și ORION EUROPE România, în baza acordului cadre de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, privind finanțarea „Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului”, a primit în dotare 4 stații automate de monitorizare a calității aerului repartizate astfel: 2 pe Deva, 1 Hunedoara și 1 Călan, precum și două panouri de informare a publicului: 1 panou exterior, amplasat în Deva, P-ța Victoriei și 1 panou interior la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25.

În urma completării rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, prin

Contractul nr. 4361/2007, s-a primit o stație automată pentru municipiul Vulcan, care a fost pusă în funcțiune începând cu luna martie 2010 și un panou interior de informare a publicului, amplasat în incinta Primăriei Municipiului Vulcan.

Tipul stațiilor este următorul:

- HD - 1 stație fond urban – Deva str. Carpați;
- HD - 2 stație fond industrial 1 – Deva, Calea Zarandului;
- HD - 3 stație fond industrial 1- Hunedoara, str.Bicicliștilor;
- HD - 4 stație fond industrial 1- Călan, str.Furnalistului;
- HD – 5 stație fond industrial 1 – Vulcan, B-dul Mihai Viteazu.

Stația de fond urban monitorizează indicatorii: NOx/NO₂, SO₂, CO, O₃, COV, PM₁₀, Pb, stația meteo.

Stațiile de fond industrial monitorizează indicatorii: NOx/NO₂, SO₂, CO, O₃, PM₁₀, Pb, stația meteo, cu excepția stației HD-5 de la Vulcan care nu măsoară ozonul.

Datele validate în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare a calității aerului, sunt prezentate în tabelele următoare:

Județ	Stația	Tip stație	Poluant (UM)	Valoare minimă orară lunată	Valoare medie orară lunată	Valoare maximă orară lunată	Nr. depășiri valoare limită/valoare țintă/prag de informare
Hunedoara	HD-1	F.U.	SO ₂ (µg/mc)	5,78	9,65	80,77	-
			NO ₂ (µg/mc)	4,04	21,15	69,39	-
			CO (mg/mc)	0,01	0,76	3,92	-
			O ₃ (µg/mc)	0,70	21,42	70,52	-
			Benzen (µg/mc)	0,78	3,74	11,09	-
			PM10 (µg/mc)	3,00	18,86	55,74	-
	HD-2	F.I.	SO ₂ (µg/mc)	-1,19	11,39	103,35	-
			NO ₂ (µg/mc)	1,76	19,88	65,12	-
			CO (mg/mc)	0,02	0,48	2,70	-
			O ₃ (µg/mc)	1,83	33,94	105,60	-
			PM10 (µg/mc)	0	55,01	213,02	-
	HD-4	F.I.	SO ₂ (µg/mc)	3,57	6,35	24,14	-
			NO ₂ (µg/mc)	4,71	17,58	55,78	-
			CO (mg/mc)	0,02	0,47	2,23	-
			O ₃ (µg/mc)	-	-	-	-
			PM10 (µg/mc)	-	-	-	-
	HD-5	F.I.	SO ₂ (µg/mc)	-	-	-	-
			NO ₂ (µg/mc)	-	-	-	-
			CO (mg/mc)	-	-	-	-
			PM10 (µg/mc)	-	-	-	-

Tabel nr. 1.3.1. Date de monitorizare a calității aerului
(medii orare în luna februarie 2017 - stații automate)

Nr crt	Indicator	UM	Valoarea minimă a mediei zilnice	Valoarea maximă a mediei zilnice	Valoarea medie lunată
Stația HD-1					
1.	SO2	µg/mc	6,33	27,03	9,626
2.	NO2	µg/mc	9,80	45,06	21,134
3.	CO	mg/mc	0,04	2,58	0,755
4.	O3	µg/mc	4,62	42,64	21,485
5.	benzen	µg/mc	3,35	5,15	4,093
6.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	7,13	34,89	19,089
7.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	9,08	72,67	27,977
8.	Pb	µg/mc	-	-	-
9.	Cd	ng/mc	-	-	-
10.	Ni	ng/mc	-	-	-
Stația HD-2					
11.	SO2	µg/mc	4,72	36,52	11,271
12.	NO2	µg/mc	9,91	41,17	20,128
13.	CO	mg/mc	0,11	1,49	0,476
14.	O3	µg/mc	7,50	65,31	33,935
15.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	10,56	122,26	55,016
16.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	14,53	110,82	48,077
17.	Pb	µg/mc	-	-	-
18.	Cd	ng/mc	-	-	-
19.	Ni	ng/mc	-	-	-
Stația HD-4					
20.	SO2	µg/mc	5,19	9,90	6,359
21.	NO2	µg/mc	10,57	31,98	17,678
22.	CO	mg/mc	0,09	1,38	0,475
23.	O3	µg/mc	-	-	-
24.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	-	-	-
25.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	7,27	96,29	39,058
26.	Pb	µg/mc	-	-	-
27.	Cd	ng/mc	-	-	-
28.	Ni	ng/mc	-	-	-
Stația HD-5					
29.	SO2	µg/mc	-	-	-
30.	NO2	µg/mc	-	-	-
31.	CO	mg/mc	-	-	-
32.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	-	-	-
33.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	-	-	-
34.	Pb	µg/mc	-	-	-
35.	Cd	ng/mc	-	-	-
36.	Ni	ng/mc	-	-	-

Tab. nr.1.3.2. Medii zilnice și lunare în luna februarie 2017 – stații automate

La stația HD-3 nu s-au înregistrat date deoarece stația nu funcționează, fiind inundată în data de 19.06.2010.

La stația HD-4 nu s-au înregistrat date la indicatorii LSPM 10 nefelometric, și O₃, deoarece analizoarele au fost defecte.

La stația HD-5 nu s-au înregistrat date la indicatorii: SO₂, NO₂, CO, PM₁₀gravimetric, Pb, Cd și Ni deoarece analizorele de SOx, NOx, CO și pompa de aspirație PM₁₀ au fost defecte.

Valorile măsurate de stațiile automate de monitorizare a calității aerului sunt comparate cu limitele pentru protecția sănătății umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prezentate în tabelul următor:

Poluant	Criteriu	Perioadă de mediere	Valoare	Unitate de măsură	Numărul de depășiri anuale permis (dacă există)
Dioxid de sulf, SO ₂	Valoare limită	o oră	350	µg/m ³	24
	Valoare limită	24h	125	µg/m ³	3
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	500	µg/m ³	Nu e cazul
Particule în suspensie, PM ₁₀	Valoare limită	o zi	50	µg/m ³	35
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m ³	Nu e cazul
Dioxid de azot, NO ₂	Valoare limită	o oră	200	µg/m ³	18
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m ³	Nu e cazul
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	400	µg/m ³	Nu e cazul
Benzen	Valoare limită	an calendaristic	5	µg/m ³	Nu e cazul
Monoxid de Carbon, CO	Valoare limită	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	10	mg/m ³	Nu e cazul
Ozon, O ₃	Valoare țintă	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	120	µg/m ³	25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani
	Pragul de informare	o oră	180	µg/m ³	-
	Pragul de alertă	o oră	240	µg/m ³	Nu e cazul
Plumb, Pb	Valoare limită	An calendaristic	0,5	µg/m ³	Nu e cazul
Arsen, As	Valoare țintă	An calendaristic	6	ng/mc	Nu e cazul
Cadmiu,Cd	Valoare țintă	An calendaristic	5	ng/mc	Nu e cazul
Nichel, Ni	Valoare țintă	An calendaristic	20	ng/mc	Nu e cazul

Tabel nr. 1.3.3. Valorile limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Dioxidul de sulf

Acest indicator a fost monitorizat, în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare din Deva (HD-1),(HD-2) și Călan (HD-4). Valorile medii, obținute la indicatorul dioxid de sulf, în luna februarie 2017, nu arată depășiri ale valorilor limită orare și zilnice prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător de $350 \mu\text{g}/\text{mc}$ (a nu se depăși mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic), respectiv de $125 \mu\text{g}/\text{mc}$ și nici depășirea pragului de alertă de $500 \mu\text{g}/\text{mc}$, înregistrat timp de 3 ore consecutive.




Figura nr. 1.3.2. Evoluția valorilor orare de SO₂ ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna februarie 2017 la stațiile automate de monitorizare




Figura nr. 1.3.3. Evoluția valorilor zilnice de SO₂ ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare

Dioxidul de azot

Valorile medii orare, obținute la indicatorul dioxid de azot, în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare HD-1 (Deva – str. Carpați), HD-2 (Deva – Calea Zarandului) și Călan (HD-4) nu arată depășiri ale valorii limită orare prevăzute în Legea nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*, respectiv de 200 $\mu\text{g}/\text{mc}$ (a nu se depăși mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) și nici depășirea pragului de alertă de 400 $\mu\text{g}/\text{mc}$, înregistrat timp de 3 ore consecutiv.




Figura nr. 1.3.4. Evoluția valorilor orare de NO₂ ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare

Monoxidul de carbon

În județul Hunedoara, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la stațiile de monitorizare a calității aerului din: Deva (HD-1),(HD-2) și Călan (HD-4). Nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită 10 mg/mc (calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore), conform Legii nr. 104/2011 *privind calitatea aerului înconjurător*.




Figura nr. 1.3.5. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore la CO (mg/mc), în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare

Ozonul

Acest indicator a fost monitorizat în luna februarie 2017 la stațiile automate de monitorizare a calității aerului: HD-1 (Deva-str.Carpați) și HD-2 (Deva-Calea Zarandului). În luna februarie 2017 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii țintă de 120 $\mu\text{g}/\text{mc}$ (calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore, a nu se depăși în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani) și nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă de 240 $\mu\text{g}/\text{mc}$ și ale pragului de informare de 180 $\mu\text{g}/\text{mc}$, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.




Figura nr. 1.3.6. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore la ozon ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare

Particule în suspensie sub 10 microni (PM₁₀)

În luna februarie 2017 valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni (PM₁₀) în aerul înconjurător, obținute la stațiile automate prin metoda gravimetrică au depășit de 8 ori valoarea limită zilnică de 50 µg/mc (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, după cum urmează:

nume statie	luna	zi din luna	valoare concentratie	justificare depasire (comentariul operatorului local)
HUNEDOARA/HD1-FU	februarie	2	72,67	
HUNEDOARA/HD1-FU	februarie	3	70,85	
HUNEDOARA/HD2-FI	februarie	2	89,02	
HUNEDOARA/HD2-FI	februarie	3	98,1	
HUNEDOARA/HD2-FI	februarie	16	90,84	
HUNEDOARA/HD2-FI	februarie	17	110,82	
HUNEDOARA/HD4-FI	februarie	2	96,29	
HUNEDOARA/HD4-FI	februarie	3	76,31	Depășirile au fost cauzate de utilizarea la încălzirea locuințelor individuale a combustibililor solizi, precum și datorită existenței instalației mari de ardere din zonă, pe fondul unor condiții meteo nefavorabile unei bune dispersii a poluanților.

Tabel nr. 1.3.7. Depășirile valorii limită zilnice pentru sănătate la indicatorul PM₁₀




Figura nr. 1.3.7. Evoluția zilnică a valorilor de PM₁₀ (µg/mc) determinat gravimetric, în luna februarie 2017, la stațiile automate de monitorizare

Metale grele

În luna februarie 2017 nu s-au efectuat determinări de plumb, nichel și cadmiu din particulele în suspensie (PM_{10}) din motive tehnice.

Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului:




Legendă:

- HD-1: Str. Carpați, Deva
- HD-2: Str. Calea Zarandului, Deva
- HD-3: Str. Aleea Bicicliștilor, Hunedoara
- HD-4: Str. Furnalistului, Călan
- HD-5: B-dul Mihai Viteazu, Vulcan


Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Hunedoara

A. Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare:

Stația HD-1 adresa: Deva, str. Carpați




Stația HD-2 adresa: Deva, Calea Zarandului



Stația HD-3 adresa: Hunedoara, Aleea Bicicliștilor

- stația nu mai funcționează din 19.06.2010 deoarece a fost inundată în urma ploilor torențiale.

Stația HD-4 adresa: Călan, str. Furnalistului




Stația HD-5 adresa: Vulcan, B-dul Mihai Viteazu

- indicele general nu s-a putut calcula întrucât nu au fost disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați (conform Ordinului MMDD nr. 1095/2007).


Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

B. Variația concentrațiilor medii zilnice măsurate pentru indicatorii specifici


Punctul de prelevare: Hunedoara, poluantul măsurat: amoniac (NH₃)
adresa: Hunedoara, str. Victoriei, f.n.




Punctul de prelevare: Deva, poluantul măsurat: amoniac (NH3)
adresa: Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25




Punctul de prelevare: Simeria, poluantul măsurat: amoniac (NH3)
adresa: Simeria, Stadion




Punctul de prelevare: Simeria, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Simeria, Stadion




Punctul de prelevare: Petroșani, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Petroșani, str. Universității, nr. 20




Punctul de prelevare: Paroșeni, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Paroșeni, str. Paroșeni, nr. 20



Punctul de prelevare: Livezeni, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Livezeni, str. Parângului



Punctul de prelevare: Hunedoara, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Hunedoara, str. Victoriei, nr. 14



Datele sunt furnizate în urma prelevării manuale și determinărilor chimice efectuate în laboratorul A.P.M. Hunedoara

1.4. Calitatea precipitațiilor

În cursul lunii februarie 2017 au fost prelevate 10 probe de precipitații, astfel că, monitorizarea calității precipitațiilor s-a realizat prin 10 puncte de supraveghere.

Calitatea precipitațiilor, respectiv valorile minime și maxime înregistrate la indicatorii monitorizați, sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Indicatorul	Intervalul
1.	- alcalinitate, mE/l	0,28-0,48
2.	- pH, unități pH	6,85 – 7,23
3.	- conductivitate, μ S/cm	66,7 – 81,4
4.	- sulfati, mg/l	7,0 – 21,0
5.	- azotați, mg/l	0,015 – 0,027
6.	- azotati, mg/l	0,011 – 0,031
7.	- cloruri, mg/l	2,03 – 13,63
8.	- amoniu, mg/l	0,020 – 0,037
9.	- ioni de calciu, mg/l	7,07 – 18,86
10.	- ioni de magneziu, mg/l	1,45 – 5,35
11.	- duritate totală, 0Germane	1,54 – 3,20

Tabel nr. 1.4.1. Precipitații – valori minime și maxime înregistrate la indicatorii monitorizați

Comparativ cu luna decembrie 2016 când s-au înregistrat precipitații, evoluția calității precipitațiilor a fost următoarea:

- alcalinitatea a înregistrat o scădere, a valorii minime cât și creștere a celei maxime, valoarea maximă fiind de 0,48 mE/l, înregistrată pe zona Chișcădaga;
- pH-ul a înregistrat o constanță a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă fiind de 7,23 unități pH, înregistrată pe zona Buituri;
- conductivitatea a înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă de 81,4 μ S/cm a fost înregistrată pe zona Buituri;
- calciu a înregistrat o creștere a valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 18,86 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- duritatea a înregistrat o creștere, atât a valorii minime cât și a celei maxime, valoarea maximă pe luna februarie 2017 fiind de 3,20 °Ge, valoare înregistrată pe zona Valea Jiului;
- magneziu a înregistrat o scădere a valorii minime cât și o creștere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 5,35 mg/l, înregistrată pe zona Valea Jiului;
- sulfatii au înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 21,0 mg/l pe zona Buituri;
- azotații au înregistrat o creștere valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind 0,027 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- azotii au înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 0,031 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- clorurile au înregistrat o constanță a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 13,63 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- amoniu a înregistrat o scădere a valorii minime și o creștere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind 0,037 mg/l, înregistrată pe zona Buituri.

CAPITOLUL 2 - DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT

Zgomotul este unul dintre factorii perturbatori ai mediului care afectează starea biologică și psihologică a oamenilor. Zgomotul este un ansamblu de sunete fără armonie, care printr-o acțiune de durată, sunt supărătoare pentru om producând leziuni ale organului auditiv. Surse de poluare fonică: traficul auto, feroviar și aerian; activitățile din construcții; zgomotul social (echipamente electrice și electronice, zgomotul generat de copii, de vecin, etc).

În luna februarie 2017 în județul Hunedoara s-au efectuat 46 măsurători de zgomot, cu frecvență de măsurare lunară (22 puncte de monitorizare) și săptămânală (6 puncte de monitorizare), în zonele cu trafic rutier intens, în zone industriale și de locuințe, parcuri și școli, precum și în zona piețelor agroalimentare. La efectuarea acestor măsurători s-a folosit un sonometru Brüel-Kjaer de tip Mediator 2238. În urma măsurătorilor efectuate în luna februarie 2017, pe teritoriul județului Hunedoara, s-au

înregistrat depășiri ale nivelului de zgomot, față de limita admisă conform STAS 10009/88, după cum urmează:

- la limita funcțională a zonelor de recreere: într-un singur punct din localitatea Hunedoara - Parc Central;
- pe stradă de categorie tehnică IV: într-un singur punct - str. Gojdu din Deva;
- în zonele rezidențiale în patru puncte: str. Paroșeni din Paroșeni, str. Piața Dacia din Petroșani, str.M.Viteazul din Lupeni și str. Atelierelor din Simeria;

Valorile nivelului de zgomot, înregistrate în luna februarie 2017, sunt prezentate în tabelele următoare:

Nr crt	Tipul de zonă în care s-a efectuat măsurătoarea	Val. admisă DB	Media dB	Minimă dB	Maximă dB	Dep. dB
1.	Hunedoara – Parc Central	45	52,0	41,2	75,6	7,0
2.	Hunedoara – Piața Obor	65	63,1	47,6	73,2	
3.	Hunedoara – Parcare OE 2	90	71,0	54,3	86,5	
4.	Zlasti – Parcare Fabrica de var	65	59,3	42,2	77,7	
5.	Calan – str. Independenței categ. tehn. IV (de deservire locală)	60	55,0	49,8	71,2	
6.	Deva – intersecția str. Oituz cu Eminescu (cat. tehnică II)	70	68,7	44,6	88,9	
7.	Deva – intersecție gară, str. de categ. tehn. I - magistrală	75-85	79,5	61,2	89,7	
8.	Deva - parcare Mall Piață	90	75,0	56,6	85,6	
9.	Deva – Cartier Micro 15	60	57,0	45,2	84,3	
10.	Deva str. Gojdu, str.cat.tehn.IV	60	61,1	51,0	74,5	1,1
11.	Deva – Sc. Regina Maria	75	71,2	63,5	82,3	
12.	Deva – str. cat. tehn. IV (de deservire locală) Aurel Vlaicu	60	57,4	46,6	86,8	
13.	Paroșeni – locuințe, str. Paroșeni mină	50	56,3	42,4	74,6	6,3
14.	Lupeni – locuințe, str.M.Viteazu nr.8	50	54,6	42,7	83,4	4,6
15.	Bărbăteni – centru-str categ.II, Euro Rink	70	66,0	44,2	86,6	
16.	Petroșani Cartier Aeroport – Locuințe, str. P-ța Dacia	50	56,8	40,9	78,3	6,8
17.	Petroșani – Magistrală (str. categ. tehnică I)	75-85	61,2	42,7	83,5	
18.	Brad – Magistrală trafic greu (str. categ. tehnică I)	75-85	76,0	54,1	88,8	
19.	Brad – Magistrala (str. categ. tehnică I) – vis a vis de Primărie	75-85	69,9	54,3	80,8	
20.	Hațeg – Magistrală (str. categ. tehnică I)	75-85	74,5	59,6	86,3	

21.	Chișcădaga – la limita zonei funcționale a S.C. Carmeuse Holding S.A.	65	67,0	51,3	78,7	2,0
22.	Chișcădaga – la limita zonei funcționale a S.C. Carpatcement Holding S.A.	65	67,2	58,7	79,8	2,2

Tabel nr. 2.1. Valorile nivelului de zgomot – frecvență de măsurare lunară februarie 2017

Nr. crt	Tipul de zona în care s-a efectuat măsurătoarea	Perioada	Val. admisă DB	Media DB	Minim a DB	Maxim a DB	Dep. DB
1.	Hunedoara – Magistrală (str. categ. tehnică I)	01.02-05.02.2017	75-85	71,5	47,8	84,5	
		06.02-12.02.2017		71,5	60,7	85,4	
		13.02-19.02.2017		73,3	47,5	82,0	
		20.02-26.02.2017		78,5	54,3	89,8	
2.	Călan – Drumul Național (Magistrală) INTERSECȚIE	01.02-05.02.2017	75-85	73,2	59,1	82,4	
		06.02-12.02.2017		73,2	59,6	84,3	
		13.02-19.02.2017		70,2	48,9	83,5	
		20.02-26.02.2017		74,4	62,1	82,2	
3.	Deva – variantă trafic rutier	01.02-05.02.2017	75-85	77,5	61,5	87,6	
		06.02-12.02.2017		82,0	56,3	94,1	
		13.02-19.02.2017		73,0	44,1	88,7	
		20.02-26.02.2017		75,0	47,5	87,2	
4.	Simeria – Magistrală (str.de categ. tehnică I) - vis a vis de biserică	01.02-05.02.2017	75-85	72,1	49,0	83,5	
		06.02-12.02.2017		71,5	57,0	89,2	
		13.02-19.02.2017		77,5	59,8	87,9	
		20.02-26.02.2017		72,3	48,6	84,3	
5.	Simeria locuințe – Str. Atelierelor (vis a vis de magazinul Profi)	01.02-05.02.2017	50	52,0	47,4	78,4	2,0
		06.02-12.02.2017		56,3	42,0	67,7	6,3
		13.02-19.02.2017		53,0	44,6	72,2	3,0
		20.02-26.02.2017		56,1	45,5	74,8	6,1
6.	Sântuhalm – Magistrală (str. categ. tehnică I) vis a vis de Petrom	01.02-05.02.2017	75-85	75,4	53,2	86,7	
		06.02-12.02.2017		73,4	48,2	87,6	
		13.02-19.02.2017		71,1	49,8	81,6	
		20.02-26.02.2017		76,0	49,8	87,6	

Tabel nr. 2.2. Valorile nivelului de zgomot – frecvență de măsurare săptămânală februarie 2017

CAPITOLUL 3 – DETERMINĂRI ALE RADIOACTIVITĂȚII

Prezentarea evoluției radioactivității factorilor de mediu pe luna februarie 2017

Radioactivitatea este fenomenul de dezintegrare a nucleelor unor atomi, însoțit de emisie de particule cu viteza foarte mare și de unde electromagnetice cu lungimi de undă foarte mică. Substanțele radioactive emit trei tipuri de radiații: alfa, beta și gama. Radiațiile alfa sunt mai puțin periculoase la iradiere exterioară dar puternice la iradiere interioară. Radiațiile beta sunt compuse din electroni în mișcare, au putere de penetrare mai mare decât cele de tip alfa, dar prezintă un adevărat pericol la contactul direct cu pielea, ingerare sau inhalare. Radiațiile gama sunt unde electromagnetice, ca și razele X, dar cu energii mult mai mari. Ele se propagă în linie dreaptă și au putere de penetrare mare, putând pătrunde fără probleme prin corpul uman și iradia organele interne fără ingerare sau contact direct. De-a lungul lanțului de dezintegrare, emisiile de radiații gama pot fi însoțite de emisii de radiații alfa și beta.

Radioactivitatea poate fi naturală (proprietatea unor elemente chimice de a emite spontan radiații) și artificială, adică fenomenul de emisie de radiații indusă prin reacții nucleare. Cele mai însemnate surse naturale și uzuale de radiații radioactive sunt:

1. radiațiile cosmice;
2. minereuri radioactive din sol;
3. raze cosmice care conțin izotopi radioactivi și pot fi ingerate prin alimente;
4. expunerile medicale;
5. deșeuri bogate în substanțe radioactive;
6. emanații de radiu din roci;
7. emanații ale radonului și toronului acumulate în perete și în aerul locuințelor neaerisite și închise cât mai etanș.

Substanțele radioactive pot supune organismele unei radiații din exterior dar și din interior, prin ingerarea de alimente iradiate sau inhalarea de diversi izotopi radioactivi.

Monitorizarea radioactivității mediului s-a realizat conform Ordinului MMP nr. 1978/2010, prin măsurători beta globale specifice a principalilor factori de mediu și calcule de concentrații ale izotopilor naturali radon și toron. Monitorizarea s-a efectuat la Stația de radioactivitate Deva, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, stație ce face parte din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (R.N.S.R.M.) a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Valorile radioactivității principalilor factori de mediu determinate, în luna februarie 2017, nu prezintă diferențe semnificative în raport cu cele obținute în luna anterioară și sunt sub nivelul de atenționare (conform Ordinului MMP nr.1978/2010) stabilit pentru fiecare factor de mediu în parte, diferențele înregistrate fiind datorate evoluției factorilor meteorologici.

Mai jos, se prezintă centralizatorul statistic pentru luna februarie 2017:

Aerosoli atmosferici Valori imediate Bq/m ³	Minima	Media	Maxima	limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	0,66	2,91	5,67	10	24	28
Aspirația 08-13	0,50	2,62	6,50	10	02	28

Aerosoli atmosferici masuratori după 5 zile, Bq/m ³	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificati ve
Aspirația 02-07	0,003±0,001	0,006	0,012±0,001	11	28
Aspirația 08-13	0,003±0,001	0,006	0,012±0,001	17	23

Radon, Bq/m ³	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	1,77±0,12	8,55	16,55±0,9	19	28
Aspirația 08-13	1,40±0,09	7,92	20,52±1,1	02	28

Toron, Bq/m ³	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	0,04±0,004	0,16	0,36±0,02	25	28
Aspirația 08-13	0,02±0,003	0,10	0,34±0,02	24	28

Depuneri atmosferice, Bq/m ² *zi	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	0,37	1,00	5,44	200	25	19
Valoare după 5 zile	0,22±0,1	0,36	0,95±0,2	200	07	16

Apă brută, Bq/mc	Minima	Media	Maxima	Limita de atențio- nare	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	326,3	708,8	1621,2	2000	14	20
Valoare după 5 zile	90,4±24,8	176,1	645,0±66,0	2000	15	18
Frecvența de prelevare	Zilnic (în zilele lucrătoare)					
Locul prelevării	Râul Mureş – localitatea Mintia					

Vegetație spontană, Bq/kg	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată					
Frecvența de prelevare	Săptămânal, în perioada aprilie - octombrie				
Locul prelevării	Curte APM Hunedoara				

Sol necultivat, Bq/kg	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	454,4±40,7	602,6	706,8±51,2	10	4
Frecvența de prelevare	Săptămânal, cu excepția perioadelor cu sol înghețat				
Locul prelevării	Curte APM Hunedoara				

Debitul dozei gama în aer MicroSv/h	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data / Ora max	Nr. valori semnificative
	0,09	0,131	0,16	0,250	07/13 ⁰⁰	672

Tabel nr. 3.1. Tabel centralizator statistic – luna februarie 2017

1. Aerosoli atmosferici

a. **Valoare imediată.** Valoarea medie a activității specifice beta globale pentru luna februarie 2017 este de 2,765 Bq/mc, fiind mai mică decât cea din luna anterioară (3,21 Bq/mc). Valoarea maximă pentru luna februarie 2017 este de 6,50 Bq/mc (obținută în data de 02.02.2017), fiind sub limita de atenționare de 10 Bq/mc (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

b. Valoare la 5 zile. Valorile măsurate după 5 zile pentru radioactivitatea aerului sunt, în general, sub limita de detecție a aparatului sau în imediata vecinătate a acesteia, rezultând lipsa unor radionuclizi artificiali de viață lungă în aer. Valoarea medie înregistrată pentru luna februarie 2017 este de 0,006 Bq/mc, fiind identică cu cea din luna anterioară.

c. Valoare radon. Valoarea medie pe luna februarie 2017 a radonului este de 8,235 Bq/mc, fiind mai mică decât cea din luna anterioară (9,955 Bq/mc). Valoarea maximă de 20,52 Bq/mc s-a obținut în data de 02.02.2017.

d. Valoare toron. Valoarea medie pe luna februarie 2017 este de 0,13 Bq/mc, fiind mai mare decât cea din luna anterioară (0,09 Bq/mc). Maxima de 0,34 Bq/mc s-a obținut în data de 24.02.2017.

e. Debitul dozei gamma absorbite în aer. Valoarea medie lunară a debitului dozei gamma în luna februarie 2017 a fost de 0,131 μ Gy/h, fiind mai mare decât cea din luna anterioară. Valoarea maximă de 0,16 μ Gy/h s-a obținut în data de 07.02.2017, ora 13, fără a depăși limita de atenționare de 0,250 μ Gy/h (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

2. Depuneri atmosferice

a. Valoare imediată. Valoarea medie a radioactivității depunerilor atmosferice, în cazul măsurătorilor imediate, pe luna februarie 2017, este de 1,00 Bq/mp*zi și prezintă o creștere față de luna precedentă (0,585 Bq/mp*zi). Valoarea maximă a activității specifice beta globale a depunerilor atmosferice a fost de 5,45 Bq/mp*zi obținându-se în data de 25.02.2017 și se situează sub limita de atenționare de 200 Bq/mp*zi (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

b. Valoare la 5 zile. Valoarea medie lunară este de 0,36 Bq/mp*zi, valoarea maximă fiind de 0,95 Bq/mp*zi, obținută în data de 07.02.2017.

3. Apa de suprafață:

În cazul măsurătorii imediate a radioactivității beta globale a apei brute pentru râul Mureș, valoarea medie pe luna ianuarie 2017 este de 595,8 Bq/mc și prezintă o scădere față de luna anterioară 720,6 Bq/mc). Maxima de 1274,3 Bq/mc s-a obținut în data de 19.01.2017 și se situează sub limita de alarmare de 2000 Bq/mc zi (conform Ordinului MMP nr. 1978/2010).

4. Ape lunare: măsuratori la 5 zile:

Valoarea medie a activității specifice beta globale, după 5 zile de la recoltare, pe luna februarie 2017 pentru râul Jiul de Vest (Uricani) este de 276,3 Bq/mc, în scădere față de luna anterioară, când s-a înregistrat o valoare de 287,8 Bq/mc.

Valoarea medie a activității specifice beta globale, după 5 zile de la recoltare pentru râul Jiul de Est (Livezeni) este de 236,1 Bq/mc, în scădere față de luna anterioară, când s-a înregistrat o valoare de 242,3 Bq/mc.

Valoarea medie a activității specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna februarie 2017, pentru râul Crișul Alb este de 182,6 Bq/mc și prezintă o creștere față de luna precedentă (254,9 Bq/mc).

Pentru râul Mureş, valoarea medie a activităţii specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna februarie 2017, este de 176,1 Bq/mc, fiind creştere faţă de luna anterioară.

În concluzie, datele obţinute în urma executării programului standard dispus relevă că, în cursul lunii februarie 2017, nu au fost depăşite limitele de atenţionare pentru factorii de mediu monitorizaţi, valorile obţinute fiind în limitele de variaţie ale fondului natural specific zonei de recoltare a probelor.

În ceea ce priveşte radioactivitatea artificială s-a constatat lipsa unor radionuclizi de viaţă lungă în principalii factori de mediu.

CAPITOLUL 4 – STAREA DE CALITATE A APELOR

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Jiu efectuează semestrial evaluarea stării corpurilor de apă de suprafaţă.

CAPITOLUL 5 – STAREA SOLULUI

În luna februarie 2017 nu au fost efectuate analize de sol de către Laboratorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

CAPITOLUL 6 – GESTIONAREA DEŞEURILOR ŞI A SUBSTANȚELOR CHIMICE PERICULOASE

6.1. Substanţe chimice periculoase şi deşeuri de substanţe chimice periculoase

În judeţul Hunedoara situaţia substanţelor chimice periculoase şi a deşeurilor periculoase se prezintă astfel:

- Compuşi cu mercur: cantitate utilizată/importată/exportată (an 2010): 0,226 /0/0kg.
- Mercur metalic-cantitate conținută (an 2012): 12 kg (termometre medicale cu mercur);
- Metale restricţionate (Cu, Cd, Ni, Pb, As, Cr) - cantităţi utilizate (an 2010): 61,5 kg (tablă de plumb), 47,5 kg (cositor Sn), 2,5 kg (sârma nichelină), 20257 kg (ferocrom);
- Compuşi ai metalelor restricţionate-cantităţi utilizate (an 2010): 36317,622 kg
- Azbest în construcţii (an 2012) - acoperişuri: 135984,495mp, pereţi cu azbest: 2234 mp. Cantităţi de deşeuri cu azbest: 5169 kg.

În judeţul Hunedoara există 5 operatori înregistraţi care fac obiectul Regulamentului nr.1907/2006 (REACH).

Eliminarea deşeurilor periculoase se face prin societăţi autorizate în acest scop pe cheltuiala proprie a producătorilor.

Eliminarea deşeurilor „istorice” rămâne încă o problemă care se va rezolva într-o perioadă mai îndelungată în funcţie de resursele financiare şi soluţiile tehnice de care se va dispune.

6.2. Suprafețe totale de teren ocupate de deșeuri industriale

➤ S.C. OMYA CALCITA S.R.L. Vața de Jos

Halda de steril Vața - Ponor - suprafața totală a depozitului: 1,88 ha

- amestec de pământ și rocă – suprafață inactivă 1,88 ha;

➤ S.C. TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara

Depozite de steril (halde de steril de la exploatarea și prepararea talcului și dolomitei - Cariera Teliuc 3 Sud: 2 ha suprafata inactivă ; halda Lelese Vest: 1,7 ha suprafata inactivă; halda Poligon - Cariera Zlaști: 2 ha suprafata activă)

Suprafața totală a depozitelor active – 2 ha;

➤ SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROȘENI

Depozite de zgură și cenușă (VALEA CAPRIȘOARA - 35 ha; Iaz Rezervă nr. 1 -8 ha)

- suprafața totală a depozitelor active – 43 ha;

➤ SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA

Depozit de zgură și cenușă (Valea Bejan);

- suprafața totală a depozitului activ – 150 ha;

➤ C.N.H. S.A. PETROȘANI:

- E.M. LONEA – haldă steril (Lonea I – 5,8 ha, Jieț – 1 ha);

- suprafața totală a depozitelor active: 6,8 ha;

- E.M. URICANI – haldă steril (Ramura II) - suprafața totală a depozitului activ: 2,7 ha;

- EPCVJ VULCAN - haldă steril (Nr. 2) - suprafața totală a depozitului activ: 8 ha;

- E.M. VULCAN - haldă steril (Valea Arsului) - suprafața totală a depozitului activ: 3,3 ha;

- E.M. LUPENI - haldă steril (Ramura III) - suprafața totală a depozitului activ: 20,63 ha;

➤ S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

- haldă steril, carieră: calcar 3 ha, argilă 2 ha, gips 4 ha;

- suprafața totală a depozitului: 9 ha.

6.3. Gospodărirea deșeurilor urbane – perioada Februarie 2017

Nr crt	Localitatea	Nr. locuitori deserviti	Numar puncte colectare				Cant. deșeuri urban(t)	Nr. containere	Alți recipienți	Capacit. colect. (mc)	Număr utilaje transp.			Suprafață haldă
			Neamenajate	Parțial amenajat	Amenajate						Autocon +	Auto comp.	Tr. remorca	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Aninoasa	4821	20	6	-	95	48		180		-	1	0,7	
2	Brad	15950	10	50	18	391.25	84	3425		3	-	-	închișă	
3	Călan	12815	14	15	8	185.56	36		90	1	-	-	închișă	
4	Deva (Salubritate)	66664	132	2	160	1672.87	110	5376	4745	4	9	3	închișă	
5	Deva (Salupan)		7	-	201	-		309	240	-	2	-		
6	Geoagiu	5704	5	16	2	340.82		2688	2		2		închișă	
7	Hunedoara	70449	-	80	50	1218.74	187	241	950	6	-	2	închișă	
8	Hățeg	10915	10	2	28	237.45	46	96	240	1	1	2	închișă	
9	Lupeni	29281	10	33	-	562	78		300	3	-	2	închișă	
10	Orăștie	21471	-	40	16	667.58	16	1010	320	-	3	2	închișă	
11	Petroșani	43197	20	11	4	986	137	440		2	3	3	închișă	
12	Petrila	25043	-	20	30	410	56	471	850	2	-	3		
13	Uricani	9540	10	26	-	166	3	20		-	-	1	închișă	
14	Vulcan	28478	32	12	7	628.49	68	175	527	2	3	3	5,5	
15	Simeria	13566	-	2	2	263.35	3	23		-	-	-	închișă	
	TOTAL	357894	270	315	526	7825.11	872	1427 4	8444	24	23	22	6,2	

Tabel nr. 6.3.1. Gospodărirea deșeurilor urbane

parțial amenajate = platformă de depozitare betonată
 amenajate = platformă de depozitare betonată

CAPITOLUL 7 - CONSERVAREA NATURII ȘI A DIVERSITĂȚII BIOLOGICE

În perioada 01.02.2017 – 28.02.2017 s-au emis 10 puncte de vedere și diverse acte specifice procedurilor de mediu în dosarele aflate în proceduri de reglementare în cadrul biroului Avize, Acorduri, Autorizatii; evaluarea initială a unor programe/proiecte precum și liste de control și emiterea unei concluzii la etapa de incadrare privind diversele planuri și proiecte ce se doresc să se desfasoară în arii naturale protejate dar și în vecinătatea acestora în conformitate cu ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

In aceasta perioada nu au fost emise autorizații de mediu în conformitate cu ord. nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică și a importului acestora.

S-au emis adrese privind diferite aspecte legate de perimetre de exploatare și amplasarea acestora fata de ANP; puncte de vedere privind zone verzi și întreținerea arboretului urban.

S-au actualizat bazele de date electronice în aplicatia IBIS privind actualizarea și înregistrarea electronică a tuturor autorizațiilor emise în anul precedent.

S-a participat la o comisie pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatică din speciile protejate, animalelor domestice în conformitate cu procedura prevăzută de HG nr. 1679/2008.

CAPITOLUL 8 – POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii februarie 2017, pe raza județului Hunedoara, nu s-a produs nici o poluare accidentală sau accidente grave de mediu.

Director Executiv,
Viorica Georgeta BARABAS

Sef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

Emilia BĂLUŞ

