



Agentia pentru Protecția Mediului Hunedoara

Nr.: 6719/ML/22.07.2016

RAPORT PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN LUNA IUNIE 2016 ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

CAPITOLUL 1 - STAREA DE CALITATE A ATMOSFEREI ȘI A PRECIPITAȚIILOR

1.1. Poluarea de impact

Aerul reprezintă factorul de mediu natural cu cele mai evidente și mai importante implicații asupra sănătății omului.

Aerul atmosferic natural, nepoluat, are o compoziție diferită de cel pe care îl inspirăm noi astăzi, mai ales cei care locuim în orașe dotate cu diverse întreprinderi de produs fum, praf și alte gaze nocive. Compoziția chimică a aerului natural este următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 20,946%, argon – 0,934%, bioxid de carbon – 0,0331%. Au mai fost detectate și următoarele elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, ozon, xenon, precum și metan, oxid de azot și vaporii de apă. Agenții poluanți evacuați în atmosferă pot fi transportați pe zone mai mari datorită acțiunii factorilor meteorologici. Principalii factori meteorologici care intervin în modificarea gradului de poluare sunt viteza vântului și stabilitatea aerului. Datorită curenților de aer, poluanții sunt răspândiți pe o suprafață mare în zonele învecinate activității poluatoare.

Surse naturale de poluare: eroziunea eoliană, incendiile, reziduurile de natură vegetală și animală și/sau fenomenele vulcanice.

Surse artificiale de poluare: centrale termoelectrice, industria siderurgică, industria metalurgică, industria chimică, întreprinderile de materiale de construcții și transporturile.

Consecințele aerului poluat asupra sănătății oamenilor:

- Efecte acute (imediate);
- Efecte cronice produse de concentrații mai reduse de poluanți atmosferici dar care în timp pot conduce la modificări patologice (ex. bronhopneumonii cronice, emfizem pulmonar, astm bronsic, pneumonie, bronșită cronică, conjunctivite, răhitism, îmbolnăviri ale aparatului nervos central, cancer pulmonar etc.);

Consecințele aerului poluat asupra construcțiilor: eroziune de degradare, eroziune de corodare, schimbarea culorii.

Consecințele aerului poluat asupra plantelor și animalelor:

- Lezarea plantelor ducând până la dispariție în unele cazuri;

- Îmbolnăvirea animalelor;

Consecințele aerului poluat asupra condițiilor de viață: atmosfera poluată crează disconfort prin imposibilitatea deschiderii ferestrelor și aerisirii încăperilor, a uscării rufelor în curte sau balcon, servirii mesei în curte, plimbărilor în aer liber, a jocului copiilor etc.

1.2. Rețeaua manuală de monitorizare a calității aerului

În rețeaua de supraveghere a poluării de impact din județul Hunedoara au fost efectuate măsurători privind: amoniacul, pulberile în suspensie, PM₁₀ și pulberile sedimentabile.

Potențialele surse de poluare ale aerului din județul Hunedoara sunt: unitățile siderurgice, unitățile de producere a energiei electrice și termice, unitățile de producere a materialelor de construcție, etc.

Monitorizarea calității aerului a fost asigurată de 5 puncte de control dotate cu pompe de aspirație pentru aerosoli, 3 puncte pentru amoniac, 1 punct pentru PM₁₀ și 25 puncte pentru pulberile sedimentabile, cu următoarea repartizare:

Județ	Oraș	Stația	Tip stație	Poluant	Tip determinare	Obs.
Hunedoara	Deva	A.P.M. Deva	Urbană	NH3	manual	STAS 12574/87
				Pulberi sedimentabile	manual	"
				PM ₁₀	manual	Legea 104/2011
		Stația IRE	Trafic	Pulberi sedimentabile	manual	STAS 12574/87
		Deva, str. Matei Corvin	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Deva, Stația hidrometeo	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Sat. Vețel	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Hunedoara	Spital Hunedoara	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
				Pulberi sedimentabile	manual	"
				NH3	manual	"
		Stația de epurare Buituri	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Hunedoara, str. Voinii, nr.6	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Sat Zlasti, nr.2	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Simeria	Simeria - stadion	Urbană	Pulberi în suspensie	manual	"
				NH3	manual	"

	Petroșani	Livezeni – Sediul Hidroconstrucția	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
		Paroșeni – DN66 A - Baraj	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
		Paroșeni – str. Minei, nr. 25	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Vulcan, str. Decebal, nr. 14	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Lupeni, str. Sohodol, nr. 7	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Petroșani – Universitate	Industrială	Pulberi în suspensie	manual	"
		Petroșani, str. 22 Decembrie, nr. 4	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Livezeni, sediu Hidroconstrucția	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Iscroni– Coroești, str. Secului, nr. 10	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Brad	Țebea– post hidro	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Vața - Poliție	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Călan	Călan - Primărie	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Orăştie	District Ape Orăştie	Urbană	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Baru Mare	Baru Mare, nr. 303	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
	Chișcădaga	Nr. 65	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Nr. 15	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Nr. 7	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Sat. Bejan, nr. 58	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"
		Șoimuș - Primărie	Industrială	Pulberi sedimentabile	manual	"

Tabel nr. 1.2.1. Situația punctelor de prelevare în județul Hunedoara

În tabelul următor este prezentată statistica lunară pentru indicatorii de calitate a aerului, rezultați în urma măsurătorilor manuale, și anume:

Nr crt	Indicator	UM	Act normativ/ Valoare limită	Nr. total probe	Nr. probe ce dep. CMA/VL/praguri♦	Minima masurată (1)	Maxima masurată (2)	Conc. medie
1.	NH ₃	mg/mc	STAS 12574/87 0,10	58	0	0,004	0,014	0,0078
2.	Pulberi in suspensie	mg/mc	STAS 12574/87 0,15	102	0	0,023	0,107	0,0625
3.	PM10	µg/mc	Legea 104/2011 50	22	0	7,87	19,6	12,225
4.	Pulberi sedimentabile	g/mp/lună	STAS 12574/87 17,0	25	0	5,01	9,4	7,00

Tabel nr. 1.2.2. Calitatea aerului – date lunare pentru indicatorii de calitate

Prelucrările statistice ale concentrațiilor indicatorilor de calitate ai aerului în județul Hunedoara nu au pus în evidență, în general, modificări semnificative ale concentrațiilor medii lunare comparativ cu luna anterioară, la indicatorii monitorizați.

Principalele surse potențiale de poluare pentru oxizii de azot și oxizii de sulf sunt reprezentate de arderea combustibililor, procesele industriale și traficul rutier, iar pentru amoniac – epurarea apelor uzate, deșeurile menajere și activitatea spitalicească. Amintim că industria cimentului reprezintă una dintre activitățile poluatoare a atmosferei datorită concentrațiilor de praf, SO₂, NO_x, CO, pulberi metalice, hidrocarburi nearse complet.

Analizând valorile medii obținute în perioada iunie 2016, în comparație cu valorile corespunzătoare lunii anterioare, s-au constatat următoarele:

➤ Amoniac (NH₃) - CMA = 0,10 mg/mc/aer/24h. Acest indicator s-a determinat în Hunedoara, Deva și Simeria. Valorile medii înregistrate, în comparație cu luna mai 2016, prezintă o ușoară creștere pe zonele Deva și Hunedoara și pe zona Simeria. Valorile medii lunare au fost cuprinse între 0,0056 mg/mc aer/24h pe zona Simeria și 0,0098 mg/mc aer/24h pe zona Hunedoara.




Fig. nr. 1.2.1. Evoluția calității amoniacului în perioada mai –iunie 2016

Fixarea azotului la înălțimi mari are loc prin reacții fotochimice cu formarea de amoniac și nitrați; la înălțimi mici azotul este fixat pe cale electrochimică (sub acțiunea descăr cărilor electrice) cu formare de amoniac. Amoniacul se degajă și de la crescătoriile de animale.

1.2.1. Poluarea cu pulberi în suspensie și sedimentabile

Pulberile sedimentabile și cele în suspensie provin de la activitățile siderurgice, termocentrale, transporturi, etc. Amintim în principal haldele de steril și iazurile de decantare, ca o caracteristică a județului Hunedoara, a căror particule sunt antrenate de vânt pe distante de zeci de kilometri. Pulberile minerale conținute în gazele de ardere evacuate în atmosferă, mai ales când instalațiile de epurare a gazelor funcționează defectuos sau nu funcționează deloc, reprezintă un pericol grav pentru plante, sol și aer. Prin depunerea acestora pe sol și plante, datorită sedimentării proprii sau acțiunii precipitațiilor, se constată o creștere a concentrației de metale grele.

Prezența particulelor solide în atmosferă influențează negativ transparenta aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei parți din căldura solară și modifică regimul precipitațiilor.

➤ Pulberi în suspensie – CMA = 0,150 mg/mc aer/24h. Valorile medii lunare, față de luna iunie 2016, au crescut ușor pe zona Valea Jiului, prezentând o constanță pe zona Simeria. Valorile medii lunare au fost cuprinse între 0,025 mg/mc aer/24h pe zona Hunedoara și 0,0878 mg/mc aer/24h pe zona Valea Jiului.




Fig. nr. 1.2.1.1. Evoluția calității pulberilor în suspensie în perioada mai – iunie 2016

➤ PM₁₀ – Valoarea limită – VL = 50 µg/mc aer/24h, conform Legii 104/2011 (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic). Valoarea medie înregistrată la acest indicator, la punctul de monitorizare situat în curtea A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în luna iunie 2016, a fost de 12,225 µg/mc aer/24h, minima

înregistrată fiind de 7,87 $\mu\text{g}/\text{mc aer}/24\text{h}$, iar valoarea maxima de 19,6 $\mu\text{g}/\text{mc aer}/24\text{h}$, fără a depăși valoarea limită zilnică prevăzută în Legea 104/2011.

Efecte asupra sănătății:

- toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar și dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul $<10 \mu$ (PM_{10}) și cele cu diametrul $<2,5 \mu$ ($\text{PM}_{2,5}$) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații.

➤ Pulberi sedimentabile – CMA = 17 g/mp/lună, valorile medii au crescut ușor, în comparație cu luna precedentă, pe zonele: Hunedoara, Călan, Brad, scăzând pe zonele: Valea Jiului, Chișcădaga și Orăștie. Valorile medii lunare au fost cuprinse între 6,08g/mp/lună pe zona Călan și 9,40 g/mp/lună pe zona Baru Mare.




Fig. nr. 1.2.1.2. Evoluția calității pulberilor sedimentabile în perioada mai - iunie 2016

1.3. Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin Contractul nr. 84/11.01.2006 încheiat între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și DAMAT Italia, în asociere cu ORION SRL Italia și ORION EUROPE România, în baza acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, privind finanțarea „Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului”, a primit în dotare 4 stații automate de monitorizare a calității aerului repartizate astfel: 2 pe Deva, 1 Hunedoara și 1 Călan, precum și două panouri de informare a publicului: 1 panou exterior, amplasat în Deva, P-ța Victoriei și 1 panou interior la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25.

În urma completării rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, prin Contractul nr. 4361/2007, s-a primit o stație automată pentru municipiul Vulcan, care a fost pusă în funcțiune începând cu luna martie 2010 și un panou interior de informare a publicului, amplasat în incinta Primăriei Municipiului Vulcan.

Tipul stațiilor este următorul:

- HD - 1 stație fond urban – Deva str. Carpați;
- HD - 2 stație fond industrial 1 – Deva, Calea Zarandului;
- HD - 3 stație fond industrial 1- Hunedoara, str.Bicicliștilor;
- HD - 4 stație fond industrial 1- Călan, str.Furnalistului;
- HD – 5 stație fond industrial 1 – Vulcan, B-dul Mihai Viteazu.

Stația de fond urban monitorizează indicatorii: NOx/NO₂, SO₂, CO, O₃, COV, PM₁₀, Pb, stația meteo.

Stațiile de fond industrial monitorizează indicatorii: NOx/NO₂, SO₂, CO, O₃, PM₁₀, Pb, stația meteo, cu excepția stației HD-5 de la Vulcan care nu măsoară ozonul.

Stația HD - 3 nu funcționează din data de 19.06.2010 deoarece a fost inundată, în urma ploilor torențiale din acea perioadă.

Datele validate în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare a calității aerului, sunt prezentate în tabelele următoare:

Județ	Stația	Tip stație	Poluant (UM)	Valoare minimă orară lună	Valoare medie orară lună	Valoare maximă orară lună	Nr. depășiri valoare limită/valoare întă/prag de informare
Hunedoara	HD-1	F.U.	SO2 (µg/mc)	0,68	8,36	32,16	-
			NO2 (µg/mc)	9,43	17,81	64,87	-
			CO (mg/mc)	0,00	0,03	0,90	-
			O3 (µg/mc)	2,87	51,63	138,09	-
			Benzen (µg/mc)	-	-	-	-
			PM10 (µg/mc)	0,54	6,25	14,13	-
	HD-2	F.I.	SO2 (µg/mc)	-	-	-	-
			NO2 (µg/mc)	2,92	7,13	33,24	-
			CO (mg/mc)	-	-	-	-
			O3(µg/mc)	9,30	36,70	110,72	-
			PM10 (µg/mc)	5,45	7,94	14,61	-
	HD-4	F.I.	SO2 (µg/mc)	1,22	8,02	13,08	-
			NO2 (µg/mc)	-	-	-	-
			CO (mg/mc)	0,00	0,03	0,28	-
			O3(µg/mc)	7,17	70,35	125,99	6 depășiri valoare întă
			PM10 (µg/mc)	0,48	3,95	12,68	-
	HD-5	F.I.	SO2 (µg/mc)	-	-	-	-
			NO2 (µg/mc)	-	-	-	-
			CO (mg/mc)	-	-	-	-
			PM10 (µg/mc)	-	-	-	-

Tabel nr. 1.3.1. Date de monitorizare a calității aerului
(medii orare în luna iunie 2016 - stații automate)

Nr crt	Indicator	UM	Valoarea minimă a mediei zilnice	Valoarea maximă a mediei zilnice	Valoarea medie lunări
Stația HD-1					
1.	SO2	µg/mc	2,79	15,82	8,495
2.	NO2	µg/mc	13,66	79,58	17,530
3.	CO	mg/mc	0,01	0,08	0,032
4.	O3	µg/mc	30,49	67,52	50,511
5.	benzen	µg/mc	-	-	-
6.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	5,59	7,24	6,417
7.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	3,63	27,25	15,504
8.	Pb	µg/mc	0,00	0,015	0,03
9.	Cd	ng/mc	-	-	-
10.	Ni	ng/mc	-	-	-
Stația HD-2					
11.	SO2	µg/mc	-	-	-
12.	NO2	µg/mc	4,51	7,136	13,10
13.	CO	mg/mc	-	-	-
14.	O3	µg/mc	21,05	36,764	53,91
15.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	6,19	7,940	10,93
16.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	7,27	9,264	12,72
17.	Pb	µg/mc	0,01	0,009	0,01
18.	Cd	ng/mc	-	-	-
19.	Ni	ng/mc	-	-	-
Stația HD-4					
20.	SO2	µg/mc	6,73	7,987	10,66
21.	NO2	µg/mc	-	-	-
22.	CO	mg/mc	0,01	0,028	0,06
23.	O3	µg/mc	30,07	71,36	91,43
24.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	2,75	3,947	4,98
25.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	3,63	6,328	9,08
26.	Pb	µg/mc	0,00	0,006	0,01
27.	Cd	ng/mc	-	-	-
28.	Ni	ng/mc	-	-	-
Stația HD-5					
29.	SO2	µg/mc	-	-	-
30.	NO2	µg/mc	-	-	-
31.	CO	mg/mc	-	-	-
32.	PM ₁₀ nefelometric	µg/mc	-	-	-
33.	PM ₁₀ gravimetric	µg/mc	-	-	-
34.	Pb	µg/mc	-	-	-
35.	Cd	ng/mc	-	-	-
36.	Ni	ng/mc	-	-	-

Tab. nr.1.3.2. Medii zilnice și lunare în luna iunie 2016 – stații automate

La stația HD-1 nu s-au înregistrat date pentru indicatorul benzen deoarece analizoarul a fost defect. Cadmiul și nichelul nu s-au putut determina deoarece aparatul de absorție atomică s-a defectat.

La stația HD-2 nu s-au înregistrat date la indicatorii SO₂ și CO deoarece analizoarele de SOx și CO au fost defecte. Cadmiul și nichelul nu s-au putut determina deoarece aparatul de absorție atomică s-a defectat.

La stația HD-3 nu s-au înregistrat date deoarece stația nu funcționează, fiind inundată în data de 19.06.2010.

La stația HD-4 nu s-au înregistrat date la indicatorul NO₂ deoarece analizoarul de NOx a fost defect. Cadmiul și nichelul nu s-au putut determina deoarece aparatul de absorție atomică s-a defectat.

La stația HD-5 nu s-au înregistrat date la indicatorii: SO₂, NO₂, CO, PM₁₀gravimetric, Pb, Cd și Ni deoarece analizorele de SOx, NOx, CO și pompa de aspirație PM₁₀ au fost defecte.

Valorile măsurate de stațiile automate de monitorizare a calității aerului sunt comparate cu limitele pentru protecția sănătății umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prezentate în tabelul următor:

Poluant	Criteriu	Perioadă de mediere	Valoare	Unitate de măsură	Numărul de depășiri anuale permis (dacă există)
Dioxid de sulf, SO ₂	Valoare limită	o oră	350	µg/m ³	24
	Valoare limită	24h	125	µg/m ³	3
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	500	µg/m ³	Nu e cazul
Particule în suspensie, PM ₁₀	Valoare limită	o zi	50	µg/m ³	35
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m ³	Nu e cazul
Dioxid de azot, NO ₂	Valoare limită	o oră	200	µg/m ³	18
	Valoare limită	an calendaristic	40	µg/m ³	Nu e cazul
	Prag de alertă	3 ore consecutiv	400	µg/m ³	Nu e cazul
Benzen	Valoare limită	an calendaristic	5	µg/m ³	Nu e cazul
Monoxid de Carbon, CO	Valoare limită	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	10	mg/m ³	Nu e cazul
Ozon, O ₃	Valoare țintă	Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h	120	µg/m ³	25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani
	Pragul de informare	o oră	180	µg/m ³	-
	Pragul de alertă	o oră	240	µg/m ³	Nu e cazul
Plumb, Pb	Valoare limită	An calendaristic	0,5	µg/m ³	Nu e cazul
Arsen, As	Valoare țintă	An calendaristic	6	ng/mc	Nu e cazul
Cadmiu,Cd	Valoare țintă	An calendaristic	5	ng/mc	Nu e cazul

Poluant	Criteriu	Perioadă de mediere	Valoare	Unitate de măsură	Numărul de depășiri anuale permis (dacă există)
Nichel, Ni	Valoare ţintă	An calendaristic	20	ng/mc	Nu e cazul

Tabel nr. 1.3.3. Valorile limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Dioxidul de sulf

Acest indicator a fost monitorizat, în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare din Deva (HD-1) și Călan (HD-4). Valorile medii, obținute la indicatorul dioxid de sulf, în luna iunie 2016, nu arată depășiri ale valorilor limită orare și zilnice prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător de 350 µg/mc (a nu se depăși mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic), respectiv de 125 µg/mc și nici depășirea pragului de alertă de 500 µg/mc, înregistrat timp de 3 ore consecutive.




Figura nr. 1.3.2. Evoluția valorilor orare de SO2 ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare




Figura nr. 1.3.3. Evoluția valorilor zilnice de SO2 ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare

Dioxidul de azot

Valorile medii orare, obținute la indicatorul dioxid de azot, în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare HD-1 (Deva – str. Carpați), HD-2 (Deva – Calea Zarandului) și HD-4 (Călan - str. Furnalistului, f.n.) nu arată depășiri ale valorii limită orare prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, respectiv de 200 $\mu\text{g}/\text{mc}$ (a nu se depăși mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) și nici depășirea pragului de alertă de 400 $\mu\text{g}/\text{mc}$, înregistrat timp de 3 ore consecutiv.




Figura nr. 1.3.4. Evoluția valorilor orare de NO₂ ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare

Monoxidul de carbon

În județul Hunedoara, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la stațiile de monitorizare a calității aerului din Deva (HD-1) și Călan (HD-4). Nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită 10 mg/mc (calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore), conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.




Figura nr. 1.3.5. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore la CO (mg/mc), în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare

Ozonul

Acest indicator a fost monitorizat în luna iunie 2016 la stațiile automate de monitorizare a calității aerului HD-1 (Deva – str. Carpați), HD-2 (Deva – Calea Zarandului) și HD-4 (Călan - str. Furnalistului, f.n.). În luna iunie 2016 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii țintă de 120 $\mu\text{g}/\text{mc}$ (calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore, a nu se depăși în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani) și nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă de 240 $\mu\text{g}/\text{mc}$ și ale pragului de informare de 180 $\mu\text{g}/\text{mc}$, conform Legii nr. 104/2011.




Figura nr. 1.3.6. Evoluția valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore la ozon ($\mu\text{g}/\text{mc}$), în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare

Benzenul

Acest indicator nu a fost monitorizat, analizorul de BTX de la stația de fond urban HD-1 din Municipiul Deva, str. Carpați fiind defect.

Particule în suspensie sub 10 microni (PM_{10})

În luna iunie 2016 valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni (PM_{10}) în aerul înconjurător, obținute la stațiile automate prin metoda gravimetrică nu au depășit valoarea limită zilnică de 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ (a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) prevăzută în Legea nr. 104/2011.

Subiectul monitorizării urmărește determinarea legăturii dintre valoarea de la măsurare și valoarea limită gravimetrică.




Figura nr. 1.3.7. Evoluția zilnică a valorilor de PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{mc}$) determinat gravimetric, în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare

Metale grele

În luna iunie 2016 s-au efectuat determinări de plumb, din particulele în suspensie (PM₁₀), în urma analizei gravimetrice a filtrelor prelevate de la stațiile automate de monitorizare a calității aerului.

Valoarea limită anuală pentru plumb prevăzută de Legea nr. 104/2011 este de 0,5 $\mu\text{g}/\text{mc}$ pe an




Figura nr. 1.3.8. Evoluția valorilor zilnice de Pb ($\mu\text{g}/\text{mc}$) din PM₁₀ gravimetric, în luna iunie 2016, la stațiile automate de monitorizare

Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului:




Legendă:

- HD-1: Str. Carpați, Deva
- HD-2: Str. Calea Zarandului, Deva
- HD-3: Str. Aleea Biciclistilor, Hunedoara
- HD-4: Str. Furnalistului, Călan
- HD-5: B-dul Mihai Viteazu, Vulcan


Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Hunedoara

A. Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare:

Stația HD-1 adresa: Deva, str. Carpați




Stația HD-2 adresa: Deva, Calea Zarandului



Stația HD-3 adresa: Hunedoara, Aleea Biciclistilor

- stația nu mai funcționează din 19.06.2010 deoarece a fost inundată în urma ploilor torențiale.

Stația HD-4 adresa: Călan, str. Furnalistului




Stația HD-5 adresa: Vulcan, B-dul Mihai Viteazu

- indicele general nu s-a putut calcula încrât nu au fost disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați (conform Ordinului MMDD nr. 1095/2007).


Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

B. Variația concentrațiilor medii zilnice măsurate pentru indicatorii specifici


Punctul de prelevare: Hunedoara, poluantul măsurat: amoniac (NH3)
adresa: Hunedoara, str. Victoriei, f.n.




Punctul de prelevare: Deva, poluantul măsurat: amoniac (NH3)
adresa: Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25




Punctul de prelevare: Simeria, poluantul măsurat: amoniac (NH3)
adresa: Simeria, Stadion




Punctul de prelevare: Simeria, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Simeria, Stadion




Punctul de prelevare: Petroșani, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Petroșani, str. Universității, nr. 20




Punctul de prelevare: Paroșeni, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Paroșeni, str. Paroșeni, nr. 20



Punctul de prelevare: Livezeni, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Livezeni, str. Parângului



Punctul de prelevare: Hunedoara, poluantul măsurat: Pulberi în suspensie
adresa: Hunedoara, str. Victoriei, nr. 14



Datele sunt furnizate în urma prelevării manuale și determinărilor chimice efectuate în laboratorul A.P.M. Hunedoara.

1.4. Calitatea precipitațiilor

În cursul lunii iunie 2016 au fost prelevate 10 probe de precipitații, astfel că, monitorizarea calității precipitațiilor s-a realizat prin 10 puncte de supraveghere.

Calitatea precipitațiilor, respectiv valorile minime și maxime înregistrate la indicatorii monitorizați, sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Indicatorul	Intervalul
1.	- alcalinitate, mE/l	0,18 – 0,34
2.	- pH, unități pH	6,85– 7,20
3.	- conductivitate, $\mu\text{S}/\text{cm}$	68,2 – 94,2
4.	- sulfati, mg/l	8,0 – 19,0
5.	- azotați, mg/l	0,011 – 0,017
6.	- azotitați, mg/l	0,008– 0,015
7.	- cloruri, mg/l	1,35 – 5,51

8.	- amoniu, mg/l	0,015 – 0,030
9.	- ioni de calciu, mg/l	4,8 – 14,14
10.	- ioni de magneziu, mg/l	2,55 – 4,62
11.	- duritate totală, °Germane	1,30 – 2,97

Tabel nr. 1.4.1. Precipitații – valori minime și maxime înregistrate la indicatorii monitorizați

Comparativ cu luna anterioară când s-au înregistrat precipitații, evoluția calității precipitațiilor a fost următoarea:

- alcalinitatea a înregistrat o scădere a ambelor valori, valoarea maximă fiind de 0,34 mE/l, înregistrată la Chișcădaga;
- pH-ul a înregistrat o scădere a ambelor valori, valoarea maximă fiind de 7,12 unități pH, înregistrată la Buituri;
- conductivitatea a înregistrat o creștere, atât a valorii minime, cât și a celei maxime, valoarea maximă de 94,2 μ S/cm a fost înregistrată pe zona Chișcădaga;
- calciu a înregistrat o creștere, atât a valorii minime, cât și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 14,14 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- duritatea a înregistrat o creștere a valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă pe luna mai 2016 fiind de 2,97 °Ge, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga;
- magneziu a înregistrat o creștere a valorii minime și o scădere a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 4,62 mg/l, înregistrată pe Teliuc;
- sulfati au înregistrat o creștere, atât a valorii minime, cât și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 19,0 mg/l pe zona Buituri;
- azotații au înregistrat o creștere a valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind 0,017 mg/l, valoare înregistrată pe zona Teliuc;
- azotii au înregistrat o creștere a valorii minime și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind de 0,015 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga ;
- clorurile au înregistrat o scădere a ambelor valori, valoarea maximă înregistrată fiind de 5,51 mg/l, valoare înregistrată pe zona Chișcădaga ;
- amoniu a înregistrat o creștere, atât a valorii minime, cât și a celei maxime, valoarea maximă înregistrată fiind 0,030 mg/l, înregistrată pe zona Hunedoara-Buituri.

CAPITOLUL 2 - DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT

Zgomotul este unul dintre factorii perturbatori ai mediului care afectează starea biologică și psihologică a oamenilor. Zgomotul este un ansamblu de sunete fără armonie, care printr-o acțiune de durată, sunt supărătoare pentru om producând lezuni ale organului auditiv. Surse de poluare fonică: traficul auto, feroviar și aerian; activitățile din construcții; zgomotul social (echipamente electrice și electronice, zgomotul generat de copii, de vecin, etc).

În luna iunie 2016 în județul Hunedoara s-au efectuat 46 măsurători de zgomot, cu frecvență de măsurare lunată (22 puncte de monitorizare) și săptămânală (6 puncte

de monitorizare), în zonele cu trafic rutier intens, în zone industriale și de locuințe, parcuri și școli, precum și în zona piețelor agroalimentare. La efectuarea acestor măsurători s-a folosit un sonometru Brüel-Kjaer de tip Mediator 2238. În urma măsurătorilor efectuate în luna iunie 2016, pe teritoriul județului Hunedoara, s-au înregistrat depășiri ale nivelului de zgomot, față de limita admisă conform STAS 10009/88, după cum urmează:

- la limita funcțională a zonelor de recreere: într-un singur punct din localitatea Hunedoara - Parc Central;
- pe stradă de categorie tehnică IV: într-un singur punct - str. Gojdu din Deva;
- în zonele rezidențiale în patru puncte: str. Paroșeni din Paroșeni, str. Piața Dacia din Petroșani, str. M. Viteazul din Lupeni și str. Atelierelor din Simeria;

Valorile nivelului de zgomot, înregistrate în luna iunie 2016, sunt prezentate în tabelele următoare:

Nr crt	Tipul de zonă în care s-a efectuat măsurătoarea	Val. admisă DB	Media DB	Minimă DB	Maximă DB	Dep. DB
1.	Hunedoara – Parc Central	45	51,1	40,5	76,6	6,1
2.	Hunedoara – Piața Obor	65	63,3	49,7	76,9	
3.	Hunedoara – Parcare OE 2	90	83,4	57,1	91,0	
4.	Zlasti – Parcare Fabrica de var	65	62,2	48,8	92,3	
5.	Calan – str. Independenței categ. tehn. IV (de deservire locală)	60	56,7	48,4	71,7	
6.	Deva – intersecția str. Oituz cu Eminescu (cat. tehnică II)	70	67,2	48,0	79,4	
7.	Deva – intersecție gară, str. de categ. tehn. I - magistrală	75-85	73,3	61,0	89,5	
8.	Deva - parcare Mall Piață	90	75,5	56,6	86,8	
9.	Deva – Cartier Micro 15	60	57,0	45,2	88,7	
10.	Deva – str. Gojdu - str cat. tehn. IV	60	61,0	53,3	76,7	1,0
11.	Deva – Sc. Regina Maria	75	71,5	63,4	84,8	
12.	Deva – str. cat. tehn. IV (de deservire locală) Aurel Vlaicu	60	57,0	41,6	77,5	
13.	Paroșeni – locuințe, str. Paroșeni mină	50	55,0	40,4	86,6	5,0
14.	Lupeni – locuințe, str. M. Viteazu nr.8	50	54,1	41,0	73,3	4,1
15.	Bărbăteni – centru-str categ. II, Euro Rink	70	66,6	46,2	81,8	
16.	Petroșani Cartier Aeroport – Locuințe, str. P-ța Dacia	50	56,1	42,4	79,9	6,1

17.	Petroșani – Magistrală (str. categ. tehnică I)	75-85	70,6	40,9	82,2	
18.	Brad – Magistrală trafic greu (str. categ. tehnică I)	75-85	67,0	49,5	87,7	
19.	Brad – Magistrala (str. categ. tehnică I) – vis a vis de Primărie	75-85	63,1	48,4	79,8	
20.	Hațeg – Magistrală (str. categ. tehnică I)	75-85	74,5	55,1	86,6	
21.	Chișcădaga – la limita zonei funcționale a S.C. Carmeuse Holding S.A.	65	62,2	51,1	79,7	
22.	Chișcădaga – la limita zonei funcționale a S.C. Carpatcement Holding S.A.	65	63,0	48,8	77,9	

Tabel nr. 2.1. Valorile nivelului de zgomot – frecvență de măsurare lunară iunie 2016

Nr. crt	Tipul de zona în care s-a efectuat măsurătoarea	Perioada	Val. admisa DB	Media DB	Minim a DB	Maxim a DB	Dep. DB
1.	Hunedoara – Magistrală (str. categ. tehnică I)	06.06 -12.06.2016	75-85	71,0	49,2	87,8	
		13.06-19.06.2016		78,4	54,2	89,1	
		20.06 -26.06.2016		71,3	50,2	89,5	
		27.06 -30.06.2016		74,0	63,5	87,2	
2.	Călan – Drumul Național (Magistrală) INTERSECȚIE	06.06 -12.06.2016	75-85	73,4	61,8	84,5	
		13.06-19.06.2016		73,2	61,6	82,3	
		20.06 -26.06.2016		72,1	56,7	90,2	
		27.06 -30.06.2016		71,1	59,4	85,5	
3.	Deva – variantă trafic rutier	06.06 -12.06.2016	75-85	78,2	63,4	88,1	
		13.06-19.06.2016		75,0	47,7	87,5	
		20.06 -26.06.2016		78,3	58,8	88,3	
		27.06 -30.06.2016		77,4	59,0	89,7	
4.	Simeria – Magistrală (str.de categ. tehnică I) - vis a vis de biserică	06.06 -12.06.2016	75-85	71,2	49,0	84,3	
		13.06-19.06.2016		72,2	48,9	84,4	
		20.06 -26.06.2016		75,0	44,2	86,7	
		27.06 -30.06.2016		71,5	57,0	88,4	

5.	Simeria locuințe Str. Atelierelor (vis a vis de magazinul Profi)	06.06 -12.06.2016	50	52,1	47,7	79,5	2,1
		13.06-19.06.2016		56,1	45,0	73,8	6,1
		20.06 -26.06.2016		54,0	45,3	74,8	4,0
		27.06 -30.06.2016		55,1	41,3	65,4	5,1
6.	Sântuhalm – Magistrală (str. categ. tehnică I) vis a vis de Petrom	06.06 -12.06.2016	75-85	75,0	53,1	86,8	
		13.06-19.06.2016		76,5	49,7	87,6	
		20.06 -26.06.2016		77,6	54,2	87,0	
		27.06 -30.06.2016		54,4	48,5	67,8	

Tabel nr. 2.2. Valorile nivelului de zgomot – frecvență de măsurare săptămânală iunie 2016

CAPITOLUL 3 – DETERMINĂRI ALE RADIOACTIVITĂȚII **Prezentarea evoluției radioactivității factorilor de mediu** **pe luna iunie 2016**

Radioactivitatea este fenomenul de dezintegrare a nucleelor unor atomi, însotit de emisie de particule cu viteză foarte mare și de unde electromagnetice cu lungimi de undă foarte mică. Substanțele radioactive emit trei tipuri de radiații: alfa, beta și gama. Radiațiile alfa sunt mai puțin periculoase la iradiere exterioară dar puternice la iradiere interioară. Radiațiile beta sunt compuse din electroni în mișcare, au putere de penetrare mai mare decat cele de tip alfa, dar prezintă un adevărat pericol la contactul direct cu pielea, ingerare sau inhalare. Radiațiile gama sunt unde electromagnetice, ca și razele X, dar cu energii mult mai mari. Ele se propagă în linie dreaptă și au putere de penetrare mare, putând pătrunde fără probleme prin corpul uman și iradia organele interne fără ingerare sau contact direct. De-a lungul lanțului de dezintegrare, emisiile de radiații gama pot fi însotite de emisii de radiații alfa și beta.

Radioactivitatea poate fi naturală (proprietatea unor elemente chimice de a emite spontan radiații) și artificială, adică fenomenul de emisie de radiații indusă prin reacții nucleare. Cele mai însemnante surse naturale și uzuale de radiații radioactive sunt:

1. radiațiile cosmice;
2. minereuri radioactive din sol;
3. raze cosmice care conțin izotopi radioactivi și pot fi ingerate prin alimente;
4. expuneri medicale;
5. deșeuri bogate în substanțe radioactive;
6. emanațiile de radiu din roci;
7. emanațiile radonului și toronului acumulate în pereții și în aerul locuințelor neaerisite și închise cât mai etanș.

Substanțele radioactive pot supune organismele unei radiații din exterior dar și din interior, prin ingerarea de alimente iradiate sau inhalarea de diverși izotopi radioactivi.

Monitorizarea radioactivității mediului s-a realizat conform Ordinului MMP nr. 1978/2010, prin măsurători beta globale specifice a principalilor factori de mediu și calcule de concentrații ale izotopilor naturali radon și toron. Monitorizarea s-a efectuat la Stația de radioactivitate Deva, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, stație ce face parte din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (R.N.S.R.M.) a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Valorile radioactivității principalilor factori de mediu determinate, în luna iunie 2016, nu prezintă diferențe semnificative în raport cu cele obținute în luna anterioară și sunt sub nivelul de atenționare (conform Ordinului MMP nr.1978/2010) stabilit pentru fiecare factor de mediu în parte, diferențele înregistrate fiind datorate evoluției factorilor meteorologici.

Mai jos, se prezintă centralizatorul statistic pentru luna iunie 2016:

Aerosoli atmosferici Valori imediate Bq/m^3	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	0,55	4,15	9,58	10	23	301
Aspirația 08-13	0,44	1,67	3,30	10	22	30

Aerosoli atmosferici masuratori după 5 zile, Bq/m^3	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	$0,003 \pm 0,001$	0,004	$0,007 \pm 0,001$	22	20
Aspirația 08-13	$0,003 \pm 0,001$	0,004	$0,006 \pm 0,001$	13	19

Radon, Bq/m^3	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	$1,63 \pm 0,11$	12,51	$28,23 \pm 1,88$	23	30
Aspirația 08-13	$1,33 \pm 0,09$	4,95	$9,45 \pm 0,65$	22	30

Toron, Bq/m^3	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Aspirația 02-07	$0,03 \pm 0,004$	0,18	$0,45 \pm 0,03$	23	30
Aspirația 08-13	$0,016 \pm 0,003$	0,08	$0,20 \pm 0,01$	22	30

Depunerি atmosferice, Bq/m ² *zi	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	0,35	1,11	4,40	200	10	22
Valoare după 5 zile	0,22±0,1	0,46	1,11±0,1	200	17	11

Apă brută, Bq/mc	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	266,3	635,3	1557,5	2000	13	21
Valoare după 5 zile	126,9±25,3	270,4	753,6±72,6	2000	15	21
Frecvența de prelevare	Zilnic (în zilele lucrătoare)					
Locul prelevării	Râul Mureş – localitatea Mintia					

Vegetație spontană, Bq/kg	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	245,0±21,6	315,8	393,2±29,6	09	5
Frecvența de prelevare	Săptămânal, în perioada aprilie - octombrie				
Locul prelevării	Curte APM Hunedoara				

Sol necultivat, Bq/kg	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative
Valoare imediată	386,1±40,6	471,5	558,0±47,9	24	4
Frecvența de prelevare	Săptămânal, cu excepția perioadelor cu sol înghețat				
Locul prelevării	Curte APM Hunedoara				

Debitul dozei gama în aer MicroSv/h	Minima	Media	Maxima	Limita de atenționare	Data / Ora max	Nr. valori semnificative
	0,056	0,090	0,123	0,250	27/18 ⁰⁰	720

Tabel nr. 3.1. Tabel centralizator statistic – luna iunie 2016

1. Aerosoli atmosferici

a. **Valoare imediată.** Valoarea medie a activității specifice beta globale pentru luna iunie 2016 este de 2,91 Bq/mc, fiind ușor mai mare decât cea din luna anterioară (2,56 Bq/mc). Valoarea maximă pentru luna iunie 2016 este de 9,58 Bq/mc (obținută în data

de 23.06.2016), fiind sub limita de atenționare de 10 Bq/mc (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

b. Valoare la 5 zile. Valorile măsurate după 5 zile pentru radioactivitatea aerului sunt, în general, sub limita de detecție a aparaturii sau în imediata vecinătate a acesteia, rezultând lipsa unor radionuclizi artificiali de viață lungă în aer. Valoarea medie înregistrată pentru luna iunie 2016 este de 0,004 Bq/mc, fiind aceeași cu cea din luna anterioară.

c. Valoare radon. Valoarea medie pe luna iunie 2016 a radonului este de 8,73 Bq/mc, fiind mai mare decât cea din luna anterioară (7,36 Bq/mc). Valoarea maximă de 28,23 Bq/mc s-a obținut în data de 23.06.2016.

d. Valoare toron. Valoarea medie pe luna iunie 2016 este de 0,13 Bq/mc, fiind în ușoară scădere față de cea obținută în luna anterioară (0,14 Bq/mc). Maxima de 0,45 Bq/mc s-a obținut în data de 23.06.2016.

e. Debitul dozei gamma absorbite în aer. Valoarea medie lunată a debitului dozei gamma în luna iunie 2016 a fost de 0,090 μ Gy/h, fiind mai mare decât cea din luna anterioară (0,083 μ Gy/h). Valoarea maximă de 0,123 μ Gy/h s-a obținut în data de 27.06.2016, ora 18⁰⁰, fără a depăși limita de atenționare de 0,250 μ Gy/h (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

2. Depunerি atmosferice

a. Valoare imediată. Valoarea medie a radioactivității depunerilor atmosferice, în cazul măsurătorilor imediate, pe luna iunie 2016, este de 1,11 Bq/mp*zi și prezintă o ușoară creștere față de luna precedentă (1,01 Bq/mp*zi). Valoarea maximă a activității specifice beta globale a depunerilor atmosferice a fost de 4,40 Bq/mp*zi, obținându-se în data de 10.06.2016 și se situează sub limita de atenționare de 200 Bq/mp*zi (conform Ordinului MMP nr.1978/2010).

b. Valoare la 5 zile. Valoarea medie lunată este de 0,46 Bq/mp*zi, valoarea maximă fiind de 1,11 Bq/mp*zi, obținută în data de 17.06.2016.

3. Apa de suprafață:

În cazul **măsurătorii imediate** a radioactivității beta globale a apei brute pentru râul Mureș, valoarea medie pe luna iunie 2016 este de 635,3 Bq/mc și prezintă o creștere față de luna anterioară (574,3 Bq/mc). Maxima de 1557,5 Bq/mc s-a obținut în data de 13.06.2016 și se situează sub limita de alarmare de 2000 Bq/mc zi (conform Ordinului MMP nr. 1978/2010).

4. Ape lunare: măsuratori la 5 zile:

Valoarea medie a activității specifice beta globale, după 5 zile de la recoltare, pe luna iunie 2016 pentru râul **Jiul de Vest** (Uricani) este minim semnificativ (< 70 Bq/mc), în scădere față de luna anterioară când s-a înregistrat o valoare de 114,4 Bq/mc.

Valoarea medie a activității specifice beta globale, după 5 zile de la recoltare pentru râul **Jiul de Est** (Livezeni) este este minim semnificativ (< 70 Bq/mc), în scădere față de luna anterioară când s-a înregistrat o valoare de 109,2 Bq/mc.

Valoarea medie a activității specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna iunie 2016, pentru râul **Crișul Alb** este de 201,9 Bq/mc și prezintă o scădere față de luna precedentă (209 Bq/mc).

Pentru râul **Mureș**, valoarea medie a activității specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna iunie 2016, este de 270,4 Bq/mc și prezintă o creștere față de luna precedentă (200,9 Bq/mc).

5. Sol necultivat: Valoarea medie a activității specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, pe luna iunie 2016, este de 471,5 Bq/kg, iar maxima de 558 Bq/kg a fost înregistrată în data de 24.06.2016.

În concluzie, datele obținute în urma executării programului standard dispus relevă că, în cursul lunii iunie 2016, nu au fost depășite limitele de atenționare pentru factorii de mediu monitorizați, valorile obținute fiind în limitele de variație ale fondului natural specific zonei de recoltare a probelor.

În ceea ce privește radioactivitatea artificială s-a constatat lipsa unor radionuclizi de viață lungă în principalii factori de mediu.

CAPITOLUL 4 – STAREA DE CALITATE A APELOR

Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Administrația Bazinală de Apă Mureș și Administrația Bazinală de Apă Jiu efectuează semestrial evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață.

CAPITOLUL 5 – STAREA SOLULUI

În luna iunie 2016 nu au fost efectuate analize de sol de către Laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.

CAPITOLUL 6 – GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR CHIMICE PERICULOASE

6.1. Substanțe chimice periculoase și deșeuri de substanțe chimice periculoase

În județul Hunedoara situația substanțelor chimice periculoase și a deșeurilor periculoase se prezintă astfel:

- Compuși cu mercur: cantitate utilizată/importată/exportată (an 2010): 0,226 /0/0kg.
- Mercur metalic-cantitate conținută (an 2012): 12 kg (termometre medicale cu mercur);
- Metale restricționate (Cu, Cd, Ni, Pb, As, Cr) - cantități utilizate (an 2010): 61,5 kg (tablă de plumb), 47,5 kg (cositor Sn), 2,5 kg (sârma nichelină), 20257 kg (ferocrom);
- Compuși ai metalelor restricționate-cantități utilizate (an 2010): 36317,622 kg

- Azbest în construcții (an 2012) - acoperișuri: 135984,495mp, pereți cu azbest: 2234 mp. Cantități de deșeuri cu azbest: 5169 kg.

În județul Hunedoara există 5 operatori înregistrați care fac obiectul Regulamentului nr.1907/2006 (REACH).

Eliminarea deșeurilor periculoase se face prin societăți autorizate în acest scop pe cheltuială proprie a producătorilor.

Eliminarea deșeurilor „istorice” rămâne încă o problemă care se va rezolva într-o perioadă mai îndelungată în funcție de resursele financiare și soluțiile tehnice de care se va dispune.

6.2. Suprafețe totale de teren ocupate de deșeuri industriale

➤ S.C. OMYA CALCITA S.R.L. Vața de Jos

Halda de steril Vața - Ponor - suprafața totală a depozitului: 1,88 ha
- amestec de pământ și rocă – suprafață inactivă 1,88 ha;

➤ S.C. TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara

Depozite de steril (halde de steril de la exploatarea și prepararea talcului și dolomitei - Cariera Teliuc 3 Sud: 2 ha suprafata inactiva ; halda Lelese Vest: 1,7 ha suprafata inactiva; halda Poligon - Cariera Zlaști: 2 ha suprafata activa)

Suprafața totală a depozitelor active – 2 ha;

➤ SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROȘENI

Depozite de zgură și cenușă (VALEA CAPRIȘOARA - 35 ha; Iaz Rezervă nr. 1 -8 ha)
- suprafața totală a depozitelor active – 43 ha;

➤ SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA

Depozit de zgură și cenușă (Valea Bejan);

- suprafața totală a depozitului activ – 150 ha;

➤ C.N.H. S.A. PETROȘANI:

- E.M. LONEA – haldă steril (Lonea 1 – 5,8 ha, Jieț – 1 ha);
- suprafața totală a depozitelor active: 6,8 ha;
- E.M. URICANI – haldă steril (Ramura II) - suprafața totală a depozitului activ: 2,7 ha;
- EPCVJ VULCAN - haldă steril (Nr. 2) - suprafața totală a depozitului activ: 8 ha;
- E.M. VULCAN - haldă steril (Valea Arsului) - suprafața totală a depozitului activ: 3,3 ha;
- E.M. LUPENI - haldă steril (Ramura III) - suprafața totală a depozitului activ: 20.63 ha;

➤ S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

- haldă steril, carieră: calcar 3 ha, argilă 2 ha, gips 4 ha;
- suprafața totală a depozitului: 9 ha.

6.3. Gospodărirea deșeurilor urbane – perioada iunie 2016

Nr crt	Localitatea	Nr. locuitori deserviti	Numar puncte colectare			Cant. deșeuri urbane(t)	Nr. containere	Alți recipienți	Capacit. colect. (mc)	Număr utilaje transp.			Suprafață halată
			Neamenajate	Parțial amenajat	Amenajate					Autocon	Auto comp.	Tr. remorca	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aninoasa	4821	20	6	-	105,6	48		180		-	1	0,7
2	Brad	15950	10	50	18	501,36	84	3425		3	-	-	închișă
3	Călan	12815	14	15	8	177,54	36		90	1	-	-	închișă
4	Deva (Salubritate)	66664	132	2	160	1676,7	110	5376	4745	4	9	3	închișă
5	Deva (Salupan)		7	-	201	-		309	240	-	2	-	
6	Geoagiu	5704	5	16	2	315,92		2688	2		2		închișă
7	Hunedoara	70449	-	80	50	406,5	187	241	950	6	-	2	închișă
8	Hațeg	10915	10	2	28	292	46	96	240	1	1	2	închișă
9	Lupeni	29281	10	33	-	429	78		300	3	-	2	închișă
10	Orăștie	21471	-	40	16	207,49	16	1010	320	-	3	2	închișă
11	Petroșani	43197	20	11	4	779,64	137	440		2	3	3	închișă
12	Petrila	25043	-	20	30	966,3	56	471	850	2	-	3	
13	Uricani	9540	10	26	-	61,414	3	20		-	-	1	închișă
14	Vulcan	28478	32	12	7	717	68	175	527	2	3	3	5,5
15	Simeria	13566	-	2	2	319,27	3	23		-	-	-	închișă
	TOTAL	357894	270	315	526	6955,73 4	872	1427 4	8444	24	23	22	6,2

Tabel nr. 6.3.1. Gospodărirea deșeurilor urbane

parțial amenajate = platformă de depozitare betonată
 amenajate = platformă de depozitare betonată

CAPITOLUL 7 - CONSERVAREA NATURII ȘI A DIVERSITĂȚII BIOLOGICE

În perioada 01.VI.2016 – 30.VI.2016 nu s-au efectuat deplasări în teren.

S-au emis 20 autorizații de mediu pentru recoltarea unor resurse biologice din flor și fauna sălbatică.

CAPITOLUL 8 – POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna iunie 2016 a fost înregistrată o poluare accidentală, respectiv în data de 30.06.2016, la S.C .Arcelor Mittal S.A. Hunedoara a avut loc un incendiu provocat de o reacție în cuptor. Au luat foc și au ars sacii filtranți de la instalația de desprăuire. Incendiul a fost stins de către angajați iar cuptorul a fost oprit.

A.P.M. Hunedoara în baza art.17, alin.(3) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificările și completările ulterioare a transmis, către S.C. ArcelorMittal S.A. Hunedoara, notificarea prin care se solicită ca, în termen de 60 zile să se repună în funcțiune instalația de reținere a emisiilor și a echipamentelor care asigură procesul de monitorizare continuă a emisiilor de pulberi, SO₂, NOx și CO la coșul de dispersie a gazelor de ardere generate de cuptorul electric. S.C.J. Hunedoara al G.N.M. a sancționat, S.C. Arcelor Mittal S.A. Hunedoara, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale art.73, alin.(1), lit.e) pentru nerespectarea condițiilor de funcționare prevăzute în autorizația integrată de mediu deținută pentru nerespectarea art.8 alin. (1).

**Director Executiv,
Viorica Georgeta BARABAS**

