




EVOLUȚIA CALITĂȚII AERULUI ÎN LUNA FEBRUARIE 2016

APM Mehedinți are o stație automată de tip industrial care evaluează influența traficului asupra calității aerului.

Stația automată fixă este amplasată în Dr. Tr. Severin ,strada Băile Romane nr 3


Poluanții monitorizați au fost : dioxidul de sulf (SO_2), oxizii de azot (NO_x) , monoxidul de carbon (CO) , ozonul (O_3) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară),etc.

Analizoarele care monitorizează PM_{10} , BTX , H_2S – defecte.



INDICII GENERALI DE CALITATE A AERULUI LA STAȚIA AUTOMATĂ FIXĂ

Indicii generali de calitate a aerului la stația automată fixă MH1 au fost stabiliți pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO_2), dioxid de azot (NO_2), monoxid de carbon (CO), ozon (O_3) și au variat între 1 (excelent) și 3 (bun).




DIOXIDUL DE SULF (SO_2)

În cazul dioxidului de sulf, poluant atmosferic, sursa majoră este emisia provenită din arderea cărbunelui în cadrul termocentralelor.

Concentrațiile emisiilor de dioxid de sulf își mențin aproximativ aceleasi valori pe parcursul întregii luni.

Pe perioada monitorizată, la stația fixă automată concentrațiile dioxidului de sulf nu au depășit valorile limită pentru protecția sănătății umane și pentru protecția ecosistemelor, prevăzute în legea nr 104/2011.




Valoarea maximă înregistrată a fost $43.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 10.02.2017, iar media lunii a fost de $13.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

DIOXIDUL DE AZOT (NO₂)

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot sunt reprezentate de procesele de ardere din industria energetică, instalații de ardere neindustriale și din trafic, ponderea importanței acestuia crescând ușor în ultima vreme.

Nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită conform Legii nr. 104/2011 .




Valoarea maximă înregistrată a fost $51.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 02.02.2017, iar media lunii fost de $13.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

MONOXIDUL DE CARBON (CO)

Monoxidul de carbon are drept surse: procesele de arderi incomplete a combustibililor fosili și traficul rutier.

Valoarea maximă orară înregistrată a fost $3.91 \text{ mg}/\text{m}^3$ în data de 05.02.2017, media lunară a fost de $0.67 \text{ mg}/\text{m}^3$.



Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost 3.17 mg/ m³ în data de 05.02.2017 , sub valoarea limită pentru sănătatea umană (10 mg/m³) calculată ca maximă zilnică a mediilor pe 8 ore.

OZONUL

Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. Ozonul este de două tipuri:

- stratosferic, care absoarbe radiațiile ultraviolete, protejând astfel viața pe Terra (90% din cantitatea totală de ozon);


- troposferic, poluant secundar cu acțiune puternic iritantă (10% din cantitatea totală de ozon).

Ozonul troposferic este deosebit de toxic și constituie poluantul principal al atmosferei țărilor și orașelor industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din activități industriale și trafic rutier.

Concentrațiile ozonului s-au încadrat în concentrația maxim zilnică a mediilor pe 8 ore, conform legii nr 104 /2011 ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Concentrația maximă orară înregistrată a fost de $93.08 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 16.02.2017, media lunii a fost $42.85 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost $85.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 16.02.2017.



BENZEN


Benzenul este obținut din compușii bogați în carbon care suferă o ardere incompletă.

Incepând cu data de 07.01.2017 -analizorul nu a mai functionat la parametrii optimi.

PULBERI IN SUSPENSIE - FRACTIA PM₁₀ gravimetric

Sursele de poluare atmosferică cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafața solului de către vânt sau antropice: procesele de producție, arderile din sectorul energetic, șantierele de construcții și transportul rutier, haldele și depozitele de deșeuri industriale și municipale, sistemele de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conține particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfați, dar și alte noxe toxice, adsorbite pe suprafața particulelor de aerosoli solizi).




Concentrația maximă a fost de $141.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ înregistrându-se în data de 04.02.2017 iar media lunii a fost $65.14 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

S-au înregistrat 12 depășiri ale valorii limită conform Legii nr. 104/2011

Nr crt	Data	valoare
1	01.02.2017	60.6
2	02.02.2017	103.3
3	03.02.2017	118.9
4	04.02.2017	141.9
5	05.02.2017	91.4
6	06.02.2017	54.7
7	15.02.2017	70.7
8	16.02.2017	94.6
9	17.02.2017	102.4
10	18.02.2017	97.9
11	19.02.2017	55.5
12	231.02.2017	59.1

PULBERI IN SUSPENSIE - FRACTIA PM_{2.5} gravimetric

S-au efectuat doar măsurări gravimetrice, iar rezultatele sunt prezentate în graficul de mai jos:



Concentrația maximă zilnică a fost de $59.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ înregistrându-se în data de 27.02.2017, media lunii a fost $33.43 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

ȘEF SERVICIU M & L

Ing. Mihaela GRIGORE

Intocmit,

Ing. Carmen CĂPRESCU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Mehedinți
Strada Băile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod 220234
E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel... 0252.320.396; Fax. 0252.306.018