



EVOLUȚIA CALITĂȚII AERULUI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016


APM Mehedinți are o stație automată de tip industrial care evaluează influența traficului asupra calității aerului

Stația automată fixă este amplasată în Dr. Tr. Severin ,strada Băile Romane nr 3

Poluanții monitorizați au fost : dioxidul de sulf (SO_2), oxizii de azot (NO_x) , monoxidul de carbon (CO) , ozonul (O_3),benzenul cu derivații lui (BTX) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară),etc


Analizoarele care monitorizează PM_{10} , H_2S – defecte

Senzorii: Pluv și Rel Hum %- defecti



INDICII GENERALI DE CALITATE A AERULUI LA STAȚIA AUTOMATĂ FIXĂ


Indicii generali de calitate a aerului la stația automată fixă MH1 au fost stabiliți pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO_2), dioxid de azot (NO_2), monoxid de carbon (CO), ozon (O_3) și au variat între 2 (foarte bun) și 4 (mediu)



DIOXIDUL DE SULF (SO_2)

În cazul dioxidului de sulf, poluant atmosferic, sursa majoră este emisia provenită din arderea cărbunelui în cadrul termocentralelor.

Concentrațiile emisiilor de dioxid de sulf își mențin aproximativ aceleasi valori pe parcursul întregii luni.



11


Pe perioada monitorizată, la stația fixă automată concentrațiile dioxidului de sulf nu au depășit valorile limită pentru protecția sănătății umane și pentru protecția ecosistemelor, prevăzute în legea nr 104/2011.

Valoarea maximă înregistrată a fost $48.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 30.09.2016, iar media lunii a fost de $15.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$

DIOXIDUL DE AZOT (NO₂)

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot sunt reprezentate de procesele de ardere din industria energetică, instalații de ardere neindustriale și din trafic, ponderea importanței acestuia crescând ușor în ultima vreme.


Nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită conform Legii nr. 104/2011



Valoarea maximă înregistrată a fost $26.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 10.09.2016, iar media lunii fost de $9.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$

MONOXIDUL DE CARBON (CO)

Monoxidul de carbon are drept surse: procesele de ardere incomplete a combustibililor fosili și traficul rutier




Valoarea maximă orară înregistrată a fost 0.38 mg/m^3 în data de 11.09.2016, media lunară a fost de 0.07 mg/m^3 , iar valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost 0.21 mg/m^3 în data de 30.09.2016, sub valoarea limită pentru sănătatea umană (10 mg/m^3) calculată ca maximă zilnică a mediilor pe 8 ore.

OZONUL

Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. Ozonul este de două tipuri:

- stratosferic, care absoarbe radiațiile ultraviolete, protejând astfel viața pe Terra (90% din cantitatea totală de ozon);
- troposferic, poluant secundar cu acțiune puternic iritantă (10% din cantitatea totală de ozon).

Ozonul troposferic este deosebit de toxic și constituie poluantul principal al atmosferei țărilor și orașelor industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din activității industriale și trafic rutier.



Concentrațiile ozonului s-au încadrat în concentrația maxim zilnică a mediilor pe 8 ore, conform legii nr 104 /2011, cu excepția a 6 depășiri ale valorii țintă (120 µg/m3)


Nr. crt.	Data	Valoare µg/m3
1	07.09.2016	130.4
2	08.09.2016	147.3
3	09.09.2016	136.6
4	10.09.2016	120.5

5	15.09.2016	153.2
6.	16.09.2016	161

Concentrația maximă orară înregistrată a fost de 170.48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 16.09.2016, media lunii a fost 75.22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, iar valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost 161 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 16.09.2016.

BENZEN

Benzenul este obținut din compușii bogați în carbon care suferă o ardere incompletă.




Valoarea maximă înregistrată a fost $1.96 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 30.09.2016, iar media lunii a fost de $0.53 \mu\text{g}/\text{m}^3$

PULBERI IN SUSPENSIE - FRACTIA PM_{10} gravimetric

Sursele de poluare atmosferică cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafața solului de către vânt sau antropice: procesele de producție, arderile din sectorul energetic, șantierele de construcții și transportul rutier, haldele și depozitele de deșeuri industriale și municipale, sistemele de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conține particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfați, dar și alte noxe toxice, adsorbite pe suprafața particulelor de aerosoli solizi).




Concentrația maximă a fost de 34.26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ înregistrându-se în data de 16.09.2016 iar media lunii a fost 17.32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită conform Legii nr. 104/2011

PULBERI IN SUSPENSIE - FRACTIA PM_{2.5} gravimetric

S-au efectuat doar măsurări gravimetrice, iar rezultatele sunt prezentate în graficul de mai jos:

Din data de 17.09.2016 nu s-au mai măsurat PM_{2.5} - pompa defectă.



Concentrația maximă zilnică a fost de 19.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ înregistrându-se în data de 16.09.2016, media lunii a fost 13.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

p.DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

ŞEF SERVICIU M & L
Ing. Mihaela GRIGORE

Intocmit ,
Ing . Carmen CĂPRESCU