

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNELOR
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL NEAMȚ

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Material informativ

**cu privire la pesta porcină africană destinat crescătorilor de porcine din
exploatațiile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de
biosecuritate pentru animalele pe care le dețin**

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

- a. nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- b. creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- c. nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- d. nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul monei cu animale din altă exploatație;
- e. nu cumpărați purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- f. nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.

Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

• anunțați imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul

veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul dvs. la numărul de telefon 0730330660.

Toate animalele suspecte trebuie ucise și distruse, conform legislației în vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat la prețul de piață al animalelor.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

• toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;

De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Nesecret

Anexa la nr. 553/2407-2018

Cum să fii cu un pas înaintea Pestei Porcine Africane

Pesta Porcină Africană este o boală virală

În mod obișnuit este **mortală** pentru **porcii domestici și mistreți**

Nu există vaccin sau tratament pentru această boală

Din această cauză provoacă serioase probleme socio-economice în țările afectate

Virusul rezistă câteva luni în mediul înconjurător și în cadavre

Prepararea sau afumarea cărnii de porc **NU distruge** virusul

Oamenii nu se îmbolnăvesc dar **ajută** la răspândirea virusului prin hainele sau echipamentele contaminate

Semnele clinice ale bolii sunt variabile și nu sunt ușor de recunoscut

Animalele afectate pot avea unul sau mai multe semne clinice, după cum urmează:

Febră mare, apatie și imposibilitate de a sta în picioare

Vomă, diaree, uneori cu sânge

Pete roșii-albastri pe piele, în special în zonele urechilor și rătului

Tuse și respirație îngreunată

Avorturi spontane, nașteri de feteși morți și nesiguranță în mers a purceilor

Majoritatea animalelor infectate mor în 10 zile

Contaminarea animalelor sănătoase se poate produce în multe feluri:

Prin contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi

Prin hrănirea acestora cu resturi alimentare contaminate

Contactul cu materiale contaminante

Contactul cu oamenii care poartă haine și încălțăminte contaminate

Contactați imediat medicul veterinar dacă suspectați că efectivul de animale este contaminat

Nu deplasați animalele din fermă sau gospodărie

Întotdeauna schimbați-vă îmbrăcămintea și încălțăminte atunci când părăsiți ferma sau gospodăria

Înainte de a achiziționa furaje, așternut și porci, asigurați-vă că acestea provin din unități verificate,

care au implementate toate măsurile de siguranță pentru a evita pătrunderea virusului

Asigurați-vă că porcii din gospodăria dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții sau cu porcii din alte gospodării

Niciodată să nu hrăniți porcii cu resturi alimentare

Evitați creșterea porcilor în padocurile exterioare, în zonele în care evoluează Pesta Porcină Africană

Achiziția și transportul cărnii și a preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot răspândi virusul

Vânătorii și câinii acestora nu trebuie să vină în contact cu porcii domestici după vânătoare

Fermierii sau vânătorii să nu arunce pe câmp sau în pădure resturi rezultate în urma eviscerării carcaselor de porci domestici sau mistreți

Nu aruncați resturi alimentare sau gunoi în zonele care pot fi frecventate de mistreți

Contactați medicul veterinar dacă găsiți cadavre de mistreți chiar dacă în zonă NU evoluează PESTA PORCINĂ AFRICANĂ